

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΚΕΦ. 4, 5: Όριο - Συνέχεια - Παράγωγος

Σημειώσεις Φροντιστηρίου

Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Όριο συνάρτησης: Αν $\xi, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, είναι $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \ell$ αν και μόνο αν για κάθε $\varepsilon > 0$, υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιος ώστε, για κάθε $x \in D(f)$ με

$$\begin{cases} 0 < |x - \xi| < \delta, & \text{αν } \xi \in \mathbb{R}, \\ x > \delta, & \text{αν } \xi = +\infty, \\ x < -\delta, & \text{αν } \xi = -\infty, \end{cases} \text{ να ισχύει } \begin{cases} |f(x) - \ell| < \varepsilon, & \text{αν } \ell \in \mathbb{R}, \\ f(x) > \varepsilon, & \text{αν } \ell = +\infty, \\ f(x) < -\varepsilon, & \text{αν } \ell = -\infty. \end{cases}$$

Τα πλευρικά όρια $\lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x)$ στο $\xi \in \mathbb{R}$ ορίζονται όπως παραπάνω, με την επιπλέον απαίτηση να είναι $x > \xi$ (αντίστοιχα $x < \xi$). Το όριο της f στο ξ υπάρχει αν και μόνο αν τα πλευρικά όρια υπάρχουν και είναι ίσα.

Αρχή της μεταφοράς: Αν $\xi, \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, είναι $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \ell$ αν και μόνο αν για κάθε ακολουθία (x_n) τέτοια ώστε $x_n \in D(f) \setminus \{\xi\}$ και $\lim x_n = \xi$ ισχύει $\lim f(x_n) = \ell$.

Εφαρμογές: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{1}{x}$.

Ιδιότητες ορίου: Οι τρεις πρώτες ιδιότητες ισχύουν αρκεί να υπάρχουν τα όρια $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow \xi} g(x)$, με $\xi \in \overline{\mathbb{R}}$, και να μην προκύπτει απροσδιοριστία $(+\infty - \infty, 0 \cdot (\pm\infty))$. Οι τρεις τελευταίες απαιτούν να πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις σε μια περιοχή $\pi(\xi) \setminus \{\xi\}$.

- $\lim_{x \rightarrow \xi} (kf(x) + \lambda g(x)) = k \lim_{x \rightarrow \xi} f(x) + \lambda \lim_{x \rightarrow \xi} g(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow \xi} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow \xi} f(x) \lim_{x \rightarrow \xi} g(x)$.
- $\lim_{x \rightarrow \xi} |f(x)|^k = |\lim_{x \rightarrow \xi} f(x)|^k$, για κάθε $k \in \mathbb{Q}^*$. (Το απόλυτο μπορεί να παραληφθεί, όταν $k \in \mathbb{N}^*$.)
- (Κριτήριο παρεμβολής) Αν $\lim_{x \rightarrow \xi} h(x) = \lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = \ell$ και $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, τότε $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \ell$.
- (Σύνθεση) Αν $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \ell$, $\lim_{x \rightarrow \ell} g(x) = m$ και $f(x) \neq \ell$, τότε $\lim_{x \rightarrow \xi} g(f(x)) = m$.
- Αν $\xi \in \overline{\mathbb{R}}$, $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = a \in (0, +\infty)$ και $\lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = b \in \mathbb{R}$, τότε $\lim_{x \rightarrow \xi} (f(x))^{g(x)} = a^b$.

Βασικά όρια:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = 1.$$

(Αποδεικνύονται με το κριτήριο παρεμβολής.)

Εφαρμογές:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - e^{3x}}{x}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x(e^x + e^{-x})}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x(x+2)}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x}.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a, \text{ για κάθε } a \in \mathbb{R}.$$

Ασύμπτωτες:

- Αν $\xi \in \mathbb{R}$, τότε η ευθεία $x = \xi$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη της f αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x) = \pm\infty$ ή $\lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x) = \pm\infty$.
- Αν $\xi = \pm\infty$, τότε η ευθεία $y = ax + b$ είναι
 - $\left\{ \begin{array}{l} \text{πλάγια ασύμπτωτη της } f, \quad \text{αν } a \neq 0, \\ \text{οριζόντια ασύμπτωτη της } f, \quad \text{αλλιώς,} \end{array} \right.$
 - αν και μόνο αν $\lim_{x \rightarrow \xi} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

Οι a, b υπολογίζονται ως εξής:

$$a = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x)}{x} \quad \text{και} \quad b = \lim_{x \rightarrow \xi} (f(x) - ax).$$

Ορισμός (συνέχεια συνάρτησης)

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\xi \in D(f)$ αν και μόνο αν

$$\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = f(\xi).$$

Ορισμός (ακολουθιακός ορισμός συνέχειας)

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $\xi \in D(f)$ αν και μόνο αν για κάθε ακολουθία (x_n) με $x_n \in D(f)$ και $\lim x_n = \xi$ είναι $\lim f(x_n) = f(\xi)$.

Μια συνάρτηση ονομάζεται συνεχής, αν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

Ασυνέχεια:

- **Πρώτου είδους:** Αν τα πλευρικά όρια $\lim_{x \rightarrow \xi^+} f(x)$, και $\lim_{x \rightarrow \xi^-} f(x)$ υπάρχουν στο \mathbb{R} αλλά δεν είναι και τα δύο ίσα με $f(\xi)$.
- **Δεύτερου είδους:** Αν κάποιο από τα πλευρικά όρια δεν υπάρχει.

Βασικές συνεχείς συναρτήσεις:

- Κάθε πολυωνυμική συνάρτηση.
- Κάθε ρητή συνάρτηση (πηλίκο δύο πολυωνύμων) είναι συνεχής.
- Η $f(x) = x^a$, $a \in \mathbb{R}$ είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$.
- Οι τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις.
- Οι a^x και $\log_a x$, $1 \neq a > 0$.
- Αν f, g συνεχείς τότε είναι και οι

$$kf + \lambda g, \quad fg, \quad \frac{f}{g},$$

$$(f(x))^{g(x)}, \text{ αν } f(x) > 0, \quad |f|^a, \text{ όπου } a > 0, \quad g \circ f, \text{ αν } R_f \subseteq D_g.$$

Συνέχεια σε κλειστό διάστημα: Έστω $f/[a, b]$ συνεχής.

- Η f είναι φραγμένη.
- Υπάρχουν $m, M \in [a, b]$ με $f(m) \leq f(x) \leq f(M)$, για κάθε $x \in [a, b]$. (Θεώρημα μεγίστου-ελαχίστου)
- Αν $f(a) < \gamma < f(b)$ ή $f(b) < \gamma < f(a)$, υπάρχει $\xi \in (a, b)$ με $f(\xi) = \gamma$. (Θεώρημα ενδιάμεσης τιμής)
- Αν $f(a)f(b) < 0$, υπάρχει $\xi \in (a, b)$ με $f(\xi) = 0$. (Θεώρημα Bolzano)
- Αν $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$, υπάρχει $\xi \in [a, b]$ με $f(\xi) = \xi$. (Θεώρημα σταθερού σημείου)
- Αν η f είναι 1-1, τότε η $f^{-1}/f([a, b])$ είναι επίσης συνεχής.

Ορισμός (ομοιόμορφη (ή ομαλή) συνέχεια)


Η συνάρτηση f είναι ομοιόμορφα συνεχής αν και μόνο αν

$$\text{Για κάθε } \varepsilon > 0, \text{ υπάρχει } \delta > 0 \text{ ώστε} \\ (x, y \in D(f) \text{ και } |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Η έννοια της ομοιόμορφης συνέχειας αναφέρεται σε ολόκληρο το πεδίο ορισμού της f και όχι σε μεμονωμένο σημείο. Αποδεικνύεται ότι κάθε ομοιόμορφα συνεχής συνάρτηση είναι και συνεχής. Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα. Όμως, κάθε συνεχής συνάρτηση ορισμένη σε κλειστό διάστημα είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Ομοιόμορφη συνέχεια

Όταν η συνάρτηση f είναι ομοιόμορφα συνεχής, τότε για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ ώστε η γραφική παράσταση της f να μην τέμνει την πάνω ούτε την κάτω πλευρά του ορθογωνίου με κέντρο ένα οποιοδήποτε σημείο $(x, f(x))$, κατακόρυφη πλευρά μήκους 2ε και οριζόντια πλευρά μήκους 2δ (βλ. παρακάτω σχήμα).



Λυμένη άσκηση 3, (βλ. άλυτη άσκηση 4)

Να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα πλευρικά όρια της συνάρτησης $f(x) = \cos(1/x)/\mathbb{R}^*$, όταν $x \rightarrow 0$.

Λύση

Προκειμένου να αποδείξουμε ότι το πλευρικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ δεν υπάρχει, αρκεί να βρούμε δύο ακολουθίες (x_n) και (y_n) θετικών αριθμών, τέτοιες ώστε $\lim x_n = \lim y_n = 0$ και τα όρια των ακολουθιών $(f(x_n))$, $(f(y_n))$ να υπάρχουν αλλά να είναι διαφορετικά.

Επιλέγουμε $x_n = \frac{1}{2\pi n}$ και $y_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}$, οι οποίες είναι προφανώς μηδενικές. Επιπλέον, είναι

$$\lim f(x_n) = \lim \cos(2\pi n) = \lim \cos(0) = 1,$$

$$\lim f(y_n) = \lim \cos(2\pi n + \pi/2) = \lim \cos(\pi/2) = 0 \neq 1.$$

Λύση (συνέχεια)

Άρα, πράγματι το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ δεν υπάρχει.

(Αν υπήρχε, τότε θα έπρεπε να είναι $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim f(x_n) = \lim f(y_n)$.)

Ομοίως, το πλευρικό όριο $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ δεν υπάρχει, διότι αν επιλέξουμε δύο μηδενικές ακολουθίες αρνητικών αριθμών, π.χ. τις

$$x_n = \frac{-1}{2\pi n} \quad \text{και} \quad y_n = \frac{-1}{2\pi n + \pi/2},$$

τότε

$$\lim f(x_n) = \lim \cos(-2\pi n) = \lim \cos(0) = 1,$$

$$\lim f(y_n) = \lim \cos(-2\pi n - \pi/2) = \lim \cos(-\pi/2) = 0 \neq 1.$$

Λυμένη άσκηση 13

Να ευρεθούν, αν υπάρχουν, τα όρια:

$$i) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor, \quad ii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \lfloor x \rfloor \sqrt{x}, \quad iii) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \lfloor x \rfloor}{4x^2 + 3}.$$

Λύση

i) Από τον ορισμό του ακεραίου μέρους του $x \in \mathbb{R}$, ισχύει ότι $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$, ή ισοδύναμα $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$. Επομένως,

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{x}{2} - 1 \right) \leq \frac{1}{x} \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor \leq \frac{1}{x} \frac{x}{2} = \frac{1}{2}.$$

Επειδή, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2}$, έπεται από το κριτήριο παρεμβολής ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \frac{1}{2}.$$

Λύση (συνέχεια)

ii) Ομοίως, για $x > 1$, προκύπτει ότι

$$\sqrt[x]{[x]} \leq \sqrt[x]{x} < \sqrt[x]{[x] + 1} \leq \sqrt[x]{[x] + [x]} = \sqrt[x]{[x]} \sqrt[x]{2}$$

Από τα γνωστά όρια $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{2} = 1$, προκύπτει ότι

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{[x]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{2} = 1$, άρα από το κριτήριο παρεμβολής, προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$.

Λύση (συνέχεια)

Εναλλακτικά, θέτοντας $f(x) = \sqrt[x]{x}$, έχουμε ότι

$$\frac{\ln x}{x} \leq \ln f(x) = \ln x^{1/[x]} = \frac{1}{[x]} \ln x < \frac{\ln x}{x-1}$$

Αρκεί λοιπόν ναδειχθεί ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} = 0$.

Για το πρώτο όριο, για $x > 1$, έχουμε ότι

$$0 < \frac{\ln x}{x} = \frac{\ln(\sqrt{x})^2}{x} = \frac{2 \ln \sqrt{x}}{x} < \frac{2\sqrt{x}}{x} = \frac{2}{\sqrt{x}},$$

οπότε δεδομένου ότι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$, έπεται ότι και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Επομένως, είναι και

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \cdot \frac{x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x-1} = 0 \cdot 1 = 0.$$

Λύση (συνέχεια)

iii) Ομοίως,

$$\frac{x^2 - x}{4x^2 + 3} = \frac{x(x - 1)}{4x^2 + 3} < \frac{x \lfloor x \rfloor}{4x^2 + 3} \leq \frac{x^2}{4x^2 + 3}$$

και $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x}{4x^2 + 3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{4x^2 + 3} = \frac{1}{4}$, άρα $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \lfloor x \rfloor}{4x^2 + 3} = \frac{1}{4}$.

Λυμένη άσκηση 23 (βλ. άλλτες ασκήσεις 25, 26)

Να υπολογισθούν τα όρια

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}, \quad ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{1 - \cos x}, \quad iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{1 - \cos x}, a, b \in \mathbb{R}.$$

Λύση

Θα χρησιμοποιηθεί το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, καθώς και η γνωστή ταυτότητα $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, οπότε

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x).$$

$$\begin{aligned} i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos^2 x} (1 + \cos x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{\sin^2 x} (1 + \cos x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 1(1 + \cos 0) = 2. \end{aligned}$$

Λύση (συνέχεια)

$$\begin{aligned}
 ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} (1 + \cos x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{\sin^2 x} (1 + \cos x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2}{\sin^2 x} + 1 \right) (1 + \cos x) \\
 &= \left(1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \right) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) \\
 &= (1 + 1)(1 + \cos 0) = 4.
 \end{aligned}$$

$$iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos bx}{1 - \cos x} - \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos x} \right).$$

Λύση (συνέχεια)

Επιπλέον, είναι

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos bx}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 bx}{1 - \cos^2 x} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 bx}{\sin^2 x} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos bx} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin bx}{bx} \right)^2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{bx}{\sin x} \right)^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos bx} \\
 &= \left(\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} \right)^2 b^2 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \right)^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x}{1 + \cos bx} \\
 &= 1 \cdot b^2 \cdot 1 \cdot \frac{1 + 1}{1 + 1} = b^2.
 \end{aligned}$$

Ομοίως προκύπτει και $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos x} = a^2$.

΄ρα, τελικά είναι $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{1 - \cos x} = b^2 - a^2$.

Λυμένη άσκηση 25 (βλ. άλυτη άσκηση 28)

Να υπολογισθούν τα όρια

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - e^{3x}}{x}, \quad ii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x(e^x + e^{-x})}, \quad iii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}, \quad a, b > 0.$$

Λύση

Θα χρησιμοποιηθεί το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

$$\begin{aligned} i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{7x} - e^{3x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{3x} \frac{e^{4x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (4e^{3x}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 1}{4x} \\ &= 4e^0 \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 4. \end{aligned}$$

Λύση (συνέχεια)

ii) Πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρονομαστή με e^x , προκύπτει

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x(e^x + e^{-x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x(e^{2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot \frac{2}{e^{2x} + 1} \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{e^{2x} + 1} = 1 \cdot \frac{2}{1 + 1} = 1. \end{aligned}$$

iii) Δεδομένου ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln a^x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \ln a = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} \ln a = \ln a,$$

προκύπτει ότι

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x} - \frac{b^x - 1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x} = \ln a - \ln b.$$

Λυμένη άσκηση 30 (βλ. άλυτη άσκηση 32)

Να υπολογισθεί το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + x + 1} \right)^x$.

Λύση

Θα χρησιμοποιηθεί το γνωστό όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x = e$. Θέτουμε

$$f(x) = \left(\frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + x + 1} \right)^x = \left(1 + \frac{3x + 2}{x^2 + x + 1} \right)^x \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{x^2 + x + 1}{3x + 2},$$

οπότε

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)^x = \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)^{g(x) \frac{x}{g(x)}}.$$

Αν επιπλέον τεθούν

$$G(x) = \left(1 + \frac{1}{g(x)} \right)^{g(x)} \quad \text{και} \quad h(x) = \frac{x}{g(x)},$$

Λύση (συνέχεια)

τότε, επειδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, έπεται ότι

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{g(x)}\right)^{g(x)} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z = e$$

και επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \frac{x(3x+2)}{x^2+x+1} = 3,$$

οπότε

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)^{h(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x)^{\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)} = e^3.$$

Λύση (συνέχεια)

Εναλλακτικά,

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{3x+2}{x^2+x+1} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(3x+2)}{x^2+x+1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{3x+2}{x^2+x+1} \right)}{\frac{3x+2}{x^2+x+1}} \\
 &= 3 \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\ln z}{z-1} = 3,
 \end{aligned}$$

επομένως,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln f(x)} = e^3.$$

Άσκηση

Να προσδιορισθούν οι ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f/\mathbb{R}^* , με $f(x) = x + 1/x$.

Λύση

Η f είναι συνεχής στο \mathbb{R}^* και $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty = -\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$, οπότε η $x = 0$ είναι η μοναδική κατακόρυφη ασύμπτωτη.

Για τον προσδιορισμό των πλάγιων (και οριζόντιων) ασύμπτωτων, εξετάζουμε το όριο του πηλίκου $f(x)/x$, όταν $x \rightarrow \pm\infty$. Είναι

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)/x = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (1 + 1/x^2) = 1$$

και

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1/x = 0,$$

οπότε η $y = x$ είναι (η μοναδική) πλάγια ασύμπτωτη της f .

Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι η $f(x) = x^2/[0, +\infty)$ δεν είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Λύση

Έστω $\varepsilon = 1$. Αρκεί να δειχθεί ότι για κάθε $\delta > 0$ υπάρχουν $y > x > 0$, τέτοια ώστε

$$|y - x| < \delta \quad \text{και} \quad |y^2 - x^2| \geq \varepsilon. \quad (1)$$

Αν $y = x + 1/x$, με $x > 0$, τότε

$$|y^2 - x^2| = |x^2 + 2 + 1/x^2 - x^2| = 2 + 1/x^2 > 2 > 1 = \varepsilon.$$

Επιπλέον, τότε είναι $|y - x| = 1/x$, επομένως, δοθέντος του δ , αρκεί να επιλεγθεί οποιοδήποτε $x > 1/\delta$ και $y = x + 1/x$, ώστε να ισχύουν οι ανισότητες της (1).

Άσκηση

Να αποδειχθεί ότι η $f(x) = \sqrt{x}/[0, +\infty)$ είναι ομοιόμορφα συνεχής.

Λύση

Έστω $\varepsilon > 0$. Αρκεί να δειχθεί ότι υπάρχει $\delta > 0$ ώστε

$$y > x \geq 0 \text{ και } |y - x| < \delta \Rightarrow |\sqrt{y} - \sqrt{x}| < \varepsilon. \quad (2)$$

Αν $\sqrt{y} + \sqrt{x} < \varepsilon$, τότε

$$|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{y} + \sqrt{x} < \varepsilon.$$

Αν $\sqrt{y} + \sqrt{x} \geq \varepsilon$, τότε

$$|\sqrt{y} - \sqrt{x}| = \frac{|y - x|}{\sqrt{y} + \sqrt{x}} < \frac{\delta}{\varepsilon}.$$

Επομένως, αρκεί να επιλεγθεί $\delta = \varepsilon^2$, ώστε να ισχύει η (2).

Παράγωγος

Ορισμός

Η παράγωγος $f'(\xi)$ της f στο σημείο ξ του πεδίου ορισμού της ταυτίζεται με το ακόλουθο όριο, όταν αυτό υπάρχει και είναι πραγματικός αριθμός:

$$\lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\xi + h) - f(\xi)}{h}.$$

Αν η f/A είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $\xi \in A$, τότε η συνάρτηση που ορίζεται από τα ζεύγη $(\xi, f'(\xi))$ ονομάζεται παράγωγος συνάρτηση της f και συμβολίζεται με $f'(x)$ ή $\frac{df}{dx}$.

Πρόταση

Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο ξ , τότε θα είναι και συνεχής σε αυτό.

Κανόνες παραγωγίσης: Αν f, g παραγωγίσιμες συναρτήσεις, τότε

- $(\lambda f + kg)' = \lambda f' + kg'$ (Γραμμικότητα)
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$,
ή ισοδύναμα $\frac{df \circ g}{dx} = \frac{df \circ g}{dg} \frac{dg}{dx}$ (Κανόνας αλυσίδας)
- $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$

Βασικές παραγωγίσεις:

$f(x)$	c	x^a	$\ln x $	e^x	a^x	$\sin x$	$\cos x$
$f'(x)$	0	ax^{a-1}	$\frac{1}{x}$	e^x	$a^x \ln a$	$\cos x$	$-\sin x$

$f(x)$	$\arcsin x$	$\arccos x$	$\operatorname{arctg} x$	$\operatorname{arcctg} x$
$f'(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\frac{-1}{1+x^2}$

Παράγωγος ανώτερης τάξης: Η n -οστή παράγωγος $f^{(n)}(x)$ (ή $\frac{d^n f}{dx^n}$)

της $f(x)$, όπου $n \in \mathbb{N}$, ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$ και $f^{(0)}(x) = f(x)$ (με την προϋπόθεση βέβαια ότι η $f^{(k)}(x)$ παραγωγίζεται, για κάθε $k < n$).

Βασικές παράγωγοι n τάξης:

$$\cos^{(n)} x = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right), \quad \sin^{(n)} x = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Εφαπτομένη: Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $(\xi, f(\xi))$ είναι:

- Η $y - f(\xi) = f'(\xi)(x - \xi)$, αν η f παραγωγίζεται στο ξ .

Η κάθετη στην εφαπτομένη αυτή είναι η $y - f(\xi) = -\frac{1}{f'(\xi)}(x - \xi)$.

- Η $x = \xi$, αν $\lim_{x \rightarrow \xi^-} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}, \lim_{x \rightarrow \xi^+} \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \in \{-\infty, +\infty\}$.

Η τιμή $f'(\xi)$ ονομάζεται *συντελεστής διεύθυνσης* ή *κλίση* της εφαπτομένης.

Παραμετρική μορφή: Αν μια καμπύλη C δίνεται σε παραμετρική μορφή δύο μεταβλητών x, y ως προς μια παράμετρο $t \in A$, δηλαδή $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = f(t), y = g(t), t \in A\}$, τότε, εφαρμόζοντας τον κανόνα της αλυσίδας, έχουμε ότι $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{g'}{f'}$, οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε την εφαπτομένη της σε κάποιο σημείο ξ .

Διαφορικό συνάρτησης: Αν μια συνάρτηση f/A είναι παραγωγίσιμη σε ένα εσωτερικό σημείο ξ του πεδίου ορισμού της, τότε ορίζεται η $f'(\xi)$ και άρα και η συνάρτηση $df(\xi)/\mathbb{R}$, με τύπο $df(\xi)(t) = f'(\xi)t$, η οποία ονομάζεται **διαφορικό της f στο σημείο ξ** .

Προσοχή! Η μεταβλητή της συνάρτησης $df(\xi)$ είναι το t και όχι το ξ . Επομένως, η εξίσωση της εφαπτομένης της f στο ξ γράφεται ως

$$y = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) = f(\xi) + df(\xi)(\Delta x), \quad \text{όπου } \Delta x = x - \xi.$$

Ο τύπος αυτός δίνει μια προσέγγιση της τιμής $f(x)$, δηλαδή είναι

$$f(x) \approx f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) = f(\xi) + df(\xi)(x - \xi).$$

Αν επιπλέον η f παραγωγίζεται σε κάθε σημείο $\xi \in A^0$, τότε ορίζεται η συνάρτηση $\xi \mapsto df(\xi)$, με πεδίο ορισμού το A^0 , η οποία ονομάζεται **διαφορικό της f** και συμβολίζεται με df . Η df είναι δηλαδή μια συνάρτηση του ξ , που απεικονίζει κάθε ξ σε μια συνάρτηση $df(\xi)$ του t . Ειδικά, το διαφορικό dx της ταυτοτικής συνάρτησης $I(x) = x$ απεικονίζει κάθε ξ στην ταυτοτική συνάρτηση $dx(\xi)(t) = I'(\xi)t = t$, οπότε $df = f' dx$.

Παράγωγος

Θεώρημα (Fermat)

Αν η f/A είναι παραγωγίσιμη στο εσωτερικό σημείο ξ του A και παρουσιάζει σε αυτό τοπικό ακρότατο, τότε είναι $f'(\xi) = 0$. (Το ξ είναι εσωτερικό σημείο του A όταν υπάρχει περιοχή $\pi(\xi) \subseteq A$.)

Θεώρημα (Rolle)

Αν η f συνεχής στο $[a, b]$, παραγωγίσιμη στο (a, b) και $f(a) = f(b)$, τότε υπάρχει $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$.

Θεώρημα (Μέσης Τιμής)

Αν η f συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) , τότε υπάρχει $\xi \in (a, b)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Πόρισμα

Αν $f, g/(a, b)$ παραγωγίσιμες, με $f'(x) = g'(x)$, για κάθε $x \in (a, b)$, τότε $f(x) = g(x) + c$, για κάποια σταθερά $c \in \mathbb{R}$.

Απροσδιόριστες μορφές: $\frac{0}{0}$, $(\pm 1) \frac{+\infty}{+\infty}$, $\pm\infty + (\mp\infty)$, $0(\pm\infty)$, 0^0 , $1^{\pm\infty}$, $(\pm\infty)^0$

Ο κανόνας του L' Hopital: Αν $f, g/\pi(\xi) \setminus \{\xi\}$ παραγωγίσιμες, $g'(x) \neq 0$ και $\lim_{x \rightarrow \xi} f(x) = \lim_{x \rightarrow \xi} g(x) = \ell$, όπου $\ell \in \{0, -\infty, +\infty\}$, και

υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \overline{\mathbb{R}}$, τότε είναι $\lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \xi} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Οι υπόλοιπες απροσδιόριστες μορφές μπορούν να επιλυθούν με τον κανόνα του L' Hopital, αφού πρώτα αναχθούν σε κάποια από τις δύο πρώτες μορφές με τη βοήθεια των τύπων:

$$f - g = \frac{\frac{f-g}{fg}}{\frac{1}{fg}} = \frac{\frac{1}{g} - \frac{1}{f}}{\frac{1}{fg}}, \quad fg = \frac{f}{\frac{1}{g}}, \quad f^g = e^{\ln f^g} = e^{g \ln f}$$

Μονοτονία: Αν f συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) , τότε

- f αύξουσα $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$ (αντίστοιχα f φθίνουσα $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$), για κάθε $x \in (a, b)$.
- $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ γνησίως αύξουσα (αντίστοιχα $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ γνησίως φθίνουσα), για κάθε $x \in (a, b)$.
(Προσοχή, στη δεύτερη περίπτωση δεν ισχύει η ισοδυναμία.)

Ακρότατα: Τα υποψήφια σημεία τοπικών ακρότατων μιας συνάρτησης ονομάζονται *κρίσιμα σημεία* και είναι: τα εσωτερικά σημεία όπου μηδενίζεται ή δεν ορίζεται η παράγωγος, καθώς και τα άκρα διαστημάτων (αρκεί η συνάρτηση να ορίζεται στα άκρα αυτά). Αν ισχύει κάποια από τις επόμενες συνθήκες:

- η f είναι συνεχής στο ξ και υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο ώστε
$$\begin{cases} x \in (\xi - \delta, \xi) \Rightarrow f'(x) > 0 \text{ και} \\ x \in (\xi, \xi + \delta) \Rightarrow f'(x) < 0. \end{cases}$$
- η f είναι παραγωγίσιμη σε κάποια περιοχή $\pi(\xi)$, με $f'(\xi) = 0$ και $f''(\xi) < 0$,

τότε το ξ είναι θέση τοπικού μεγίστου της f . Αλλάζοντας τις ανισότητες για τις f' , f'' , προκύπτει θέση τοπικού ελαχίστου.

Κυρτότητα: Η $f/(a, b)$ είναι κυρτή αν και μόνο αν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

- $f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$, για κάθε $x_1, x_2 \in (a, b)$ και $t \in (0, 1)$. (Ορισμός)
- $f'(x_1)(x_2 - x_1) \leq f(x_2) - f(x_1)$, για κάθε $x_1, x_2 \in (a, b)$.
- $f'/(a, b)$ αύξουσα.
- $f''(x) \geq 0$, για κάθε $x \in (a, b)$.

Αλλάζοντας τις ανισότητες (και θέτοντας $f'/(a, b)$ φθίνουσα), προκύπτουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες ώστε να είναι η f κοίλη. Αν ισχύουν γνήσιες ανισότητες, τότε η f είναι γνησίως κυρτή (αντίστοιχα κοίλη).

Σημείο καμπής: Κάθε σημείο της γραφικής παράστασης στο οποίο η συνάρτηση αλλάζει κυρτότητα.

- Αν το ξ είναι θέση σημείου καμπής, τότε $f''(\xi) = 0$.
- Αν $f''(\xi) = 0$ και $f'''(\xi) \neq 0$, τότε το ξ είναι θέση σημείου καμπής.

Παρατηρήσεις στον ορισμό της κυρτότητας: Έστω $f/(a, b)$ κυρτή. Τότε σύμφωνα με τον ορισμό είναι


$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2), \quad x_1, x_2 \in (a, b), t \in (0, 1). \quad (3)$$

Η παραμετρική εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία $A(x_1, y_1)$ και $B(x_2, y_2)$ είναι η

$$(x, y) = ((1-t)x_1 + tx_2, (1-t)y_1 + ty_2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Αν περιορίσουμε το t στο $[0, 1]$, τότε τα σημεία (x, y) είναι τα σημεία του ευθύγραμμου τμήματος AB .

Επομένως, η ανισότητα (3) δηλώνει γεωμετρικά ότι αν $A = (x_1, f(x_1))$ και $B = (x_2, f(x_2))$ είναι δύο σημεία της καμπύλης C_f της f , τότε κάθε σημείο (x, y) στο ευθύγραμμο τμήμα AB βρίσκεται ψηλότερα από το αντίστοιχο σημείο $(x, f(x))$ της καμπύλης C_f , δηλαδή $f(x) \leq y$ (βλ. επόμενο σχήμα).



Η ανισότητα (3) γενικεύεται επαγωγικά στην

$$f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i), \quad x_1, \dots, x_n \in (a, b), t_1, \dots, t_n \geq 0, \sum_{i=1}^n t_i = 1. \quad (4)$$

Εφαρμογή

Ναδειχθεί ότι η συνάρτηση $f(x) = -\ln x / (0, +\infty)$ είναι κυρτή και στη συνέχεια να αποδειχθεί η ανισότητα (Cauchy)

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}, \quad a_1, \dots, a_n > 0.$$

Λύση

Είναι $f'(x) = -1/x$ και $f''(x) = 1/x^2 > 0$, άρα f κυρτή.

Αφού f κυρτή, η ανισότητα (4), για $t_1 = \cdots = t_n = 1/n$, δίνει

$$-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \right) \leq -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(a_i) = -\frac{1}{n} \ln(a_1 \cdots a_n) = -\ln(\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n})$$

και, επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα (αφού $f'(x) < 0$), έπεται τελικά

$$\sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i.$$

Λυμένη άσκηση 13 (βλ. άλυτη άσκηση 17)

Να υπολογισθούν οι παράγωγοι των συναρτήσεων

$$f(x) = x^x / (1, +\infty), \quad g(x) = (x^2 + x + 1)^{x^2} / \mathbb{R}$$

Λύση

$$\begin{aligned}(f(x))' &= (x^x)' = (e^{\ln x^x})' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} (x \ln x)' \\ &= x^x (x' \ln x + x(\ln x)') = x^x (\ln x + 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{g'(x)}{g(x)} &= (\ln g(x))' = (x^2 \ln(x^2 + x + 1))' \\ &= \left(2x \ln(x^2 + x + 1) + \frac{x^2}{x^2 + x + 1} (x^2 + x + 1)' \right) \\ &= \left(2x \ln(x^2 + x + 1) + \frac{x^2(2x + 1)}{x^2 + x + 1} \right)\end{aligned}$$

Λυμένη άσκηση 23 (βλ. άλυτη άσκηση 28)

Να ευρεθούν οι σταθερές $a, b, c \in \mathbb{R}$ για τις οποίες οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^2 + ax + b/\mathbb{R}$ και $g(x) = x^3 - c/\mathbb{R}$ τέμνονται στο σημείο $(1, 2)$ και έχουν κοινή εφαπτομένη σε αυτό.

Λύση

Αφού, τέμνονται στο $(1, 2)$, θα πρέπει να είναι

$$2 = f(1) = 1 + a + b = g(1) = 1 - c,$$

οπότε $a + b = 1$, και $c = -1$.

Επιπλέον, έχουν κοινή εφαπτομένη στο σημείο αυτό, άρα

$$f'(1) = 2 \cdot 1 + a = 2 + a = g'(1) = 3 \cdot 1^2 = 3,$$

οπότε $a = 1$ και ως εκ τούτου $b = 0$.

Λυμένη άσκηση 28 (βλ. άλυτες ασκήσεις 35, 36)

Να υπολογισθεί με τη βοήθεια του διαφορικού μια προσεγγιστική τιμή του $\sqrt[3]{123}$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt[3]{x}/(0, +\infty)$, οπότε

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}. \text{ Για } x_0 = 125, \text{ είναι } f(x_0) = 5 \text{ και}$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{3 \cdot 5^2} = \frac{1}{75}. \text{ Επομένως, για } x = 123, \text{ είναι}$$


$$\begin{aligned}\sqrt[3]{123} = f(x) &\approx f(x_0) + df(x_0)(x - x_0) \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \\ &= 5 + \frac{1}{75}(123 - 125) = 5 - \frac{2}{75}.\end{aligned}$$

Λυμένη άσκηση 30 (βλ. άλλτες ασκήσεις 38, 39)

Έστω η καμπύλη με παραμετρική μορφή

$$x = x(t) = a \cos^3 t, y = y(t) = a \sin^3 t, \quad t \in [0, \pi], a \neq 0.$$

Αν η εφαπτομένη της σε ένα σημείο $A(x(t), y(t))$ τέμνει τους άξονες στα B, Γ , να δειχθεί ότι το ευθύγραμμο τμήμα $B\Gamma$ έχει σταθερό μήκος (ανεξάρτητο του t). (Σχήμα.)



Σχήμα: Η καμπύλη για $a = 2$.

Λύση

Η παράγωγος της συνάρτησης δίνεται από τον τύπο

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{a^3 \sin^2 t \cos t}{a^3 \cos^2 t (-\sin t)} = -\frac{\sin t}{\cos t}.$$

Η εξίσωση της εφαπτομένης στο σημείο $A(x(t), y(t))$ έχει εξίσωση

$$y - a \sin^3 t = -\frac{\sin t}{\cos t} (x - a \cos^3 t)$$

$$\Rightarrow y \cos t - a \sin^3 t \cos t = -x \sin t + a \cos^3 t \sin t$$

οπότε $y \cos t + x \sin t = a \sin t \cos t$. Θέτοντας $y = 0$, βρίσκουμε τις συντεταγμένες του σημείου B , δηλαδή $B = (a \cos t, 0)$. Θέτοντας $x = 0$, βρίσκουμε τις συντεταγμένες του σημείου Γ , δηλαδή $\Gamma = (0, a \sin t)$.

Επομένως, το τετράγωνο του μήκους του $B\Gamma$ ισούται με

$$(a \cos t - 0)^2 + (0 - a \sin t)^2 = a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t = a^2,$$

δηλαδή είναι σταθερό.

Λυμένη άσκηση 50 (βλ. άλυτη άσκηση 64)

Να υπολογισθούν τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x+1}, n \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

Λύση

Για το πρώτο όριο, έχουμε απροσδιοριστία ∞/∞ και εφαρμόζουμε n φορές τον κανόνα L' Hopital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(\ln x)^{n-1}(1/x)}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(\ln x)^{n-1}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)(\ln x)^{n-2}}{x} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n! \ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{x} = 0. \end{aligned}$$

Λύση (συνέχεια)

Για το δεύτερο όριο, έχουμε απροσδιοριστία $\infty - \infty$, οπότε μετασχηματίζουμε πρώτα την παράσταση σε μορφή $0/0$ και έπειτα εφαρμόζουμε τον κανόνα 2 φορές:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 + x} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Λυμένη άσκηση 51 (βλ. άλυτη άσκηση 65)

Να υπολογισθούν τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{1/x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 + 2x + 7)^{1/x}$$

Λύση

Το πρώτο όριο είναι της μορφής 1^∞ , οπότε θέτουμε $f(x) = \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{1/x}$ και υπολογίζουμε το $\lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x)$ με τον κανόνα L' Hopital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\ln \frac{1+x}{1-x} \right)'}{x'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(1+x))' - (\ln(1-x))'}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-1-x-1}{x^2-1} = \frac{-2}{-1} = 2. \end{aligned}$$

Επομένως, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln f(x)} = e^2$.

Λύση (συνέχεια)

Το δεύτερο όριο είναι της μορφής ∞^0 , οπότε θέτουμε $g(x) = (3x^2 + 2x + 7)^{1/x}$ και υπολογίζουμε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln g(x)$ με τον κανόνα L' Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(3x^2 + 2x + 7)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x + 2}{3x^2 + 2x + 7} = 0.$$

Επομένως, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\ln g(x)} = e^0 = 1.$

Άλυτη άσκηση 18

Να αποδειχθεί ότι $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λύση

Έστω $y = f(x) = \operatorname{tg} x / (-\pi/2, \pi/2)$, οπότε $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Βάσει της ταυτότητας $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, διαιρώντας κατά μέλη με $\cos^2 x$, προκύπτει ότι

$$1 + y^2 = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x} = f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

Κατόπιν τούτου, εφαρμόζοντας τον τύπο της θεωρίας $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$, έχουμε ότι

$$(\operatorname{arctg})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \cos^2 x = \frac{1}{1+y^2},$$

δηλαδή $(\operatorname{arctg} x)' = 1/(1+x^2)$.

Άλυτη άσκηση 51

Να αποδειχθούν, με τη βοήθεια του Θ.Μ.Τ., οι ανισότητες

$$\rho(x-1) < x^\rho - 1 < \rho x^{\rho-1}(x-1), \quad x > 1, \rho > 1,$$

$$\frac{\pi}{4} - \frac{1-x}{1+x^2} < \arctg x < \frac{\pi}{4} - \frac{1-x}{2}, \quad 0 < x < 1.$$

Λύση

$$\rho(x-1) < x^\rho - 1 < \rho x^{\rho-1}(x-1) \Leftrightarrow \rho < \frac{x^\rho - 1}{x-1} < \rho x^{\rho-1}$$

Εφαρμόζοντας το ΘΜΤ για τη συνάρτηση $f(t) = t^\rho / [1, x]$, προκύπτει ότι υπάρχει $\xi \in (1, x)$, τέτοιο ώστε $\rho \xi^{\rho-1} = f'(\xi) = \frac{x^\rho - 1}{x-1}$. Όμως, για $\rho > 1$, είναι

$$1 < \xi < x \Rightarrow \rho < \rho \xi^{\rho-1} < \rho x^{\rho-1},$$

οπότε προκύπτει το ζητούμενο.

Λύση (συνέχεια)

Ομοίως για τη δεύτερη ανισότητα,

$$\begin{aligned}
 -\frac{1-x}{1+x^2} < \operatorname{arctg} x - \pi/4 < -\frac{1-x}{2} &\Leftrightarrow -\frac{1}{1+x^2} < \frac{\operatorname{arctg} x - \pi/4}{1-x} < -\frac{1}{2} \\
 &\Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{\operatorname{arctg} x - \pi/4}{x-1} < \frac{1}{1+x^2}
 \end{aligned}$$

Εφαρμόζοντας το ΘΜΤ για τη συνάρτηση $g(t) = \operatorname{arctg} t/[x, 1]$, προκύπτει ότι υπάρχει $\xi \in (x, 1)$, τέτοιο ώστε

$$\frac{1}{1+\xi^2} = g'(\xi) = \frac{\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} 1}{x-1} = \frac{\operatorname{arctg} x - \pi/4}{x-1}. \text{ Όμως,}$$

$$x < \xi < 1 \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1^2} < \frac{1}{1+\xi^2} < \frac{1}{1+x^2},$$

οπότε προκύπτει το ζητούμενο.

Άλυτη άσκηση 44

Να αποδειχθεί ότι η εξίσωση $e^{x-2} + x - 3 = 0$ έχει ακριβώς μία λύση.

Λύση

Έστω $f(x) = e^{x-2} + x - 3/\mathbb{R}$, οπότε $f'(x) = e^{x-2} + 1 > 0$. Παρατηρούμε ότι $f(2) = 1 - 1 = 0$, άρα το 2 είναι μια ρίζα της εξίσωσης. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη ρίζα $\rho \neq 2$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας θεωρούμε ότι $\rho > 2$. Τότε εφαρμόζοντας το θεώρημα Rolle στο διάστημα $[2, \rho]$, προκύπτει ότι υπάρχει $\xi \in (2, \rho)$, τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$, το οποίο είναι άτοπο, αφού $f'(x) > 0$ για κάθε x .

Άλυτη άσκηση 54

Έστω $f/[a, b]$ συνεχής συνάρτηση, για την οποία υπάρχει η $f''/(a, b)$. Αν το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(b, f(b))$ τέμνει τη γραφική παράσταση της f σε ένα τρίτο σημείο $C(c, f(c))$, με $a < c < b$, να αποδειχθεί ότι υπάρχει σημείο $\xi \in (a, b)$ με $f''(\xi) = 0$.

Λύση

Το ευθύγραμμο τμήμα AC έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{f(c) - f(a)}{c - a}$ και το ευθύγραμμο τμήμα CB έχει συντελεστή διεύθυνσης $\frac{f(b) - f(c)}{b - c}$. επειδή τα σημεία A, C, B είναι συνευθειακά, έπεται ότι

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

Λύση (συνέχεια)

Επιπλέον, εφαρμόζοντας το ΘΜΤ στα διαστήματα $[a, c]$ και $[c, b]$, προκύπτει ότι υπάρχουν αντίστοιχα $\xi_1 \in (a, c)$ και $\xi_2 \in (c, b)$, τέτοια ώστε

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}, \quad f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c}.$$

Επομένως, $f'(\xi_1) = f'(\xi_2)$ και εφαρμόζοντας το θεώρημα Rolle για την f' στο $[\xi_1, \xi_2]$, προκύπτει ότι υπάρχει $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ τέτοιο ώστε $f''(\xi) = 0$.

Άλυτη άσκηση 58

Να αποδειχθεί η ταυτότητα

$$\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg}(1+x+x^2), \quad x \in \mathbb{R}$$

και στη συνέχεια να υπολογισθεί το άθροισμα $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}(1+n+n^2)$.

Λύση

Θεωρούμε τις συναρτήσεις

$$f(x) = \operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg} x \quad \text{και} \quad g(x) = \operatorname{arctg}(1+x+x^2).$$

Λύση (συνέχεια)

Παραγωγίζοντας, βρίσκουμε ότι

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{1 + (1+x)^2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{1+x^2 - (1 + (1+x)^2)}{(1 + (1+x)^2)(1+x^2)} \\
 &= \frac{x^2 - (1+x)^2}{(1+1+2x+x^2)(1+x^2)} \stackrel{y=1+x+x^2}{=} \frac{-2x-1}{(1+x+y)(y-x)} \\
 &= \frac{-2x-1}{y-x+xy-x^2+y^2-yx} = \frac{-2x-1}{y-x-x^2+y^2} \\
 &= \frac{-2x-1}{1+y^2} = g'(x),
 \end{aligned}$$

άρα η συνάρτηση $f - g$ είναι σταθερή σε όλο το \mathbb{R} , δηλαδή $f(x) - g(x) = c$, για κάποια σταθερά c , την οποία υπολογίζουμε θέτοντας οποιαδήποτε τιμή στο x :

$$c = f(0) - g(0) = \arctg 1 - \arctg 0 - \arctg 1 = \frac{\pi}{4} - 0 - \frac{\pi}{4} = 0.$$

Λύση (συνέχεια)

Επομένως, η ταυτότητα ισχύει. Κατόπιν τούτου,

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \operatorname{arctg}(1 + k + k^2) = \sum_{k=1}^n (\operatorname{arctg}(1 + k) - \operatorname{arctg} k) \\ &= \operatorname{arctg}(n + 1) - \operatorname{arctg} 1 = \operatorname{arctg}(n + 1) - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

και επομένως,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg}(1 + n + n^2) = \lim s_n = \lim \operatorname{arctg}(n + 1) - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

Άσκηση

Αν $n \in \mathbb{N}^*$ και $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, με $a_1^2 + \dots + a_n^2 > 0$:

i) Να ευρεθεί η τιμή του $x \in \mathbb{R}$ που ελαχιστοποιεί την παράσταση

$$f(x) = \sum_{k=1}^n (xa_k - b_k)^2.$$

ii) Να αποδειχθεί η ανισότητα (Cauchy-Schwarz):

$$(a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2).$$

Λύση

i) Θέτουμε $a = a_1^2 + \dots + a_n^2$, $b = b_1^2 + \dots + b_n^2$ και $c = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$.

Η f είναι πολυώνυμο του x , άρα συνεχής και παραγωγίσιμη στο \mathbb{R} , με

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n ((xa_k - b_k)^2)' = 2 \sum_{k=1}^n (xa_k - b_k)a_k = 2ax - 2c$$

Λύση (συνέχεια)

και $f''(x) = 2a > 0$. Επομένως, είναι $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = c/a$, δηλαδή το c/a είναι θέση τοπικού ακροτάτου, το οποίο είναι ελάχιστο, διότι $f''(c/a) > 0$. Μάλιστα, είναι το ολικό ελάχιστο της f , διότι δεν υπάρχουν άλλα κρίσιμα σημεία.

ii) Η $f(x)$ γράφεται στη μορφή

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (xa_k - b_k)^2 = \sum_{i=1}^n (x^2 a_k^2 - 2xa_k b_k + b_k^2) = ax^2 - 2cx + b.$$

Αφού η f είναι μη αρνητική (ως άθροισμα τετραγώνων), έπεται ότι

$$0 \leq f(c/a) = a(c/a)^2 - 2c(c/a) + b = \frac{ab - c^2}{a}$$

και άρα προκύπτει ότι $c^2 \leq ab$, δηλαδή η ζητούμενη ανισότητα.

Σημείωση: Η ανισότητα του (ii) προφανώς ισχύει και όταν $a = 0$.

Θεώρημα (Taylor)

Έστω συνάρτηση $f(t)$, για την οποία υπάρχουν και είναι συνεχείς οι $f, f', \dots, f^{(n)}/[a, b]$ και υπάρχει και η $f^{(n+1)}/(a, b)$. Τότε, για κάθε $x, x_0 \in [a, b]$ και για κάθε $\nu \in [n + 1]$, υπάρχει ξ μεταξύ των x, x_0 τέτοιο ώστε

$$f(x) = R_n(x) + \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k,$$

όπου $R_n(x) = \frac{(x - x_0)^\nu (x - \xi)^{n-\nu+1}}{\nu n!} f^{(n+1)}(\xi)$.

Για $\nu = 1$, η $R_n(x)$ ονομάζεται υπόλοιπο *Cauchy*, ενώ για $\nu = n + 1$, ονομάζεται υπόλοιπο *Lagrange*.

Αν $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ και μόνο τότε είναι

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Η έκφραση αυτή ονομάζεται *σειρά Taylor* της συνάρτησης f γύρω από το σημείο $x = x_0$. Ειδικά για $x_0 = 0$ προκύπτει η *σειρά Maclaurin* της συνάρτησης f , δηλαδή

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Βασικές σειρές Maclaurin:

$$\bullet \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

$$\bullet e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{και} \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{και} \quad \cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\bullet \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$$

$$\bullet (1+x)^r = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{r}{n} x^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r(r-1)\cdots(r-n+1)}{n!} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

και $r \in \mathbb{R}$.

Οι διωνυμικοί συντελεστές ορίζονται από τον τύπο

$$\binom{r}{k} = \begin{cases} \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-k+1)}{k!}, & k > 0 \\ 1, & k = 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{R}.$$

Μια σημαντική ταυτότητα των διωνυμικών συντελεστών είναι η ακόλουθη:

$$\binom{r}{k} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}, \quad k \in \mathbb{Z}, r \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

Πράγματι,

$$\begin{aligned} \binom{r}{k} &= \frac{r(r-1)(r-2)\cdots(r-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{(-r)(1-r)(2-r)\cdots(k-r-1)}{k!} \\ &= (-1)^k \frac{(k-r-1)(k-r-1-1)\cdots((k-r-1)-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k-r-1}{k}. \end{aligned}$$

Για παράδειγμα, εφαρμόζοντας την (5), για $r = -1$, έχουμε

$$\binom{-1}{k} = (-1)^k \binom{k - (-1) - 1}{k} = (-1)^k \binom{k}{k} = (-1)^k.$$

Βάσει του παραπάνω αποτελέσματος, προκύπτει ο τύπος της γεωμετρικής σειράς ως μια ειδική περίπτωση της διωνυμικής σειράς:

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= (1-x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-1}{k} (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (-x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{2k} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k \end{aligned}$$

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ο r δεν είναι ακέραιος, ο διωνυμικός συντελεστής $\binom{r}{k}$ μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει απλούστερων διωνυμικών συντελεστών. Για παράδειγμα,

$$\binom{-\frac{1}{2}}{k} = \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{2k}{k} \quad \text{και} \quad \binom{\frac{1}{2}}{k} = \frac{(-1)^{k-1}}{4^k(2k-1)} \binom{2k}{k}.$$

Πράγματι,

$$\begin{aligned}
 \binom{-\frac{1}{2}}{k} &= \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1)\cdots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!} = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{2k-1}{2})}{k!} \\
 &= \left(-\frac{1}{2}\right)^k \frac{(1)(3)\cdots(2k-1)}{k!} = \frac{(-1)^k(2k)!}{2^k k! 2 \cdot 4 \cdots (2k)} = \frac{(-1)^k(2k)!}{2^k k! 2^k k!} \\
 &= \frac{(-1)^k(2k)!}{4^k k! k!} = \frac{(-1)^k}{4^k} \binom{2k}{k}
 \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned}
 \binom{\frac{1}{2}}{k} &= \frac{(\frac{1}{2})(\frac{1}{2}-1)\cdots(\frac{1}{2}-k+1)}{k!} = \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})\cdots(-\frac{2k-3}{2})}{k!} \\
 &= \frac{(-1)^{k-1}}{2^k} \frac{(1)(1)\cdots(2k-3)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}(2k)!}{2^k k! 2 \cdot 4 \cdots (2k)(2k-1)} \\
 &= \frac{(-1)^k(2k)!}{2^k k! 2^k k! (2k-1)} = \frac{(-1)^{k-1}(2k)!}{4^k k! k! (2k-1)} = \frac{(-1)^{k-1}}{4^k(2k-1)} \binom{2k}{k}
 \end{aligned}$$

Άσκηση

Να αναπτυχθούν σε σειρές MacLaurin οι συναρτήσεις

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}, \quad x \in \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right), \quad g(x) = \sqrt{1+x^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

Λύση

Βάσει των προηγούμενων σχέσεων καθώς και του τύπου της διωνυμικής σειράς, έχουμε ότι

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-4x}} = (1-4x)^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{k} (-4x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} x^k$$

και

$$g(x) = \sqrt{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{4^k(2k-1)} \binom{2k}{k} x^{2k}.$$

Άλυτη άσκηση 85

Να αποδειχθεί ο τύπος $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$.

Λύση

Αρχικά θα αποδειχθεί με επαγωγή ότι $(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Για $n = 1$ ισχύει, αφού

$$\cos(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x \cos \frac{\pi}{2} - \sin x \sin \frac{\pi}{2} = -\sin x = (\cos x)'$$

Αν ισχύει για $n \geq 1$, τότε

$$\begin{aligned} \cos(x + (n+1)\frac{\pi}{2}) &= \cos(x + \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \cos(x + \frac{n\pi}{2}) \cos \frac{\pi}{2} - \sin(x + \frac{n\pi}{2}) \sin \frac{\pi}{2} \\ &= -\sin(x + \frac{n\pi}{2}) = (\cos(x + \frac{n\pi}{2}))' = (\cos^{(n)} x)' = \cos^{(n+1)} x. \end{aligned}$$

Επομένως, το αποτέλεσμα ισχύει για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$.

Λύση (συνέχεια)

Στη συνέχεια, εφαρμόζοντας το θεώρημα Taylor για τη συνάρτηση $f(t) = \cos t$ στο διάστημα $[-a, a]$, για $a > 0$ και για $x_0 = 0$, προκύπτει ότι για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$, $x \in [-a, a]$ και $\nu \in [n+1]$ υπάρχει ξ μεταξύ των 0 και x τέτοιο ώστε

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{x^\nu (x - \xi)^{n-\nu+1}}{\nu n!} f^{(n+1)}(\xi) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{\cos(k\pi/2)}{k!} x^k + \frac{x^\nu (x - \xi)^{n-\nu+1}}{\nu n!} \cos(\xi + (n+1)\pi/2) \end{aligned}$$

Θέτοντας $\nu = n + 1$, έχουμε ότι $R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cos(\xi + (n+1)\pi/2)$,

οπότε $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$. Θέτοντας $a_n = \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$, προκύπτει ότι

Λύση (συνέχεια)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{|x|^{n+2} (n+1)!}{(n+2)! |x|^{n+1}} = \frac{|x|}{n+2} \rightarrow 0 < 1.$$

Επομένως, από το κριτήριο της μηδενικής ακολουθίας, είναι $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,
 οπότε και $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

Επιπλέον, για $k, n \in \mathbb{N}$, είναι

$$\cos(k\pi/2) = \begin{cases} 0, & k = 2n - 1 \\ \cos(n\pi), & k = 2n \end{cases} = \begin{cases} 0, & k = 2n - 1 \\ (-1)^n, & k = 2n \end{cases}$$

Κατόπιν τούτων, έχουμε ότι

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(k\pi/2)}{k!} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n},$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Λυμένη άσκηση 65

Να αναπτυχθούν σε σειρές οι συναρτήσεις

$$f(x) = \sin^3 x / \mathbb{R}, \quad g(x) = \frac{1}{(4-x^2)^2} / (-2, 2), \quad h(x) = \ln \frac{2+x}{1-x} / (-1, 1).$$

Λύση

Θα εκφράσουμε το $\sin^3 x$ συναρτήσει του $\sin(3x)$. Είναι

$$\begin{aligned} \sin(3x) &= \sin(x + 2x) = \sin x \cos(2x) + \cos x \sin(2x) \\ &= \sin x (\cos^2 x - \sin^2 x) + \cos x (2 \sin x \cos x) \\ &= \sin x (1 - 2 \sin^2 x) + 2 \cos^2 x \sin x \\ &= (1 - 2 \sin^2 x) \sin x + 2(1 - \sin^2 x) \sin x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x, \end{aligned}$$

επομένως $4 \sin^3 x = 3 \sin x - \sin(3x)$.

Λύση (συνέχεια)

Χρησιμοποιώντας τον γνωστό τύπο της σειράς του ημιτόνου

$$\sin y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} y^{2n+1}, \quad y \in \mathbb{R},$$

προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin(3x) \\ &= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (3x)^{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{3}{4} - \frac{3^{2n+1}}{4} \right) x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3(-1)^n(1-9^n)}{4(2n+1)!} x^{2n+1} \end{aligned}$$

Λύση (συνέχεια)

Για τη συνάρτηση $g(x) = \frac{1}{(4-x^2)^2} / (-2, 2)$, έχουμε ότι

$$g(x) = (4-x^2)^{-2} = 4^{-2} \left(1 - \frac{x^2}{4}\right)^{-2}.$$

Εφαρμόζοντας τον τύπο της διωνυμικής σειράς για $y = -x^2/4 \in (-1, 1)$, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{16} (1+y)^{-2} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} y^n = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{n+1}{n} \frac{(-x^2)^n}{4^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^{n+2}} x^{2n}, \quad x \in (-2, 2). \end{aligned}$$

(Απάντηση.)

Λύση (συνέχεια)

Για την συνάρτηση $h(x) = \ln \frac{2+x}{1-x} / (-1, 1)$, θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος της λογαριθμικής σειράς

$$\ln(1+y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} y^n, \quad y \in (-1, 1].$$

$$\begin{aligned} h(x) &= \ln(2+x) - \ln(1-x) = \ln(2(1+x/2)) - \ln(1-x) \\ &= \ln 2 + \ln(1+x/2) - \ln(1-x) \end{aligned}$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x/2)^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (-x)^n$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n2^n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$$

$$= \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 + \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} \right) x^n.$$

Άσκηση (ΣΕΠ. 2020)

Να ευρεθούν οι συντελεστές της σειράς Taylor της συνάρτησης

$$f(x) = \frac{x+1}{2-x}, \text{ γύρω από το σημείο } x_0 = 1.$$

Λύση

Θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος της γεωμετρικής σειράς $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$,

$x \in (-1, 1)$. Θέτουμε $y = x - x_0 = x - 1$, οπότε

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x+1}{2-x} = \frac{(y+1)+1}{2-(y+1)} = \frac{y+2}{1-y} = \frac{y-1+3}{1-y} = -1 + \frac{3}{1-y} \\ &= -1 + 3 \sum_{n=0}^{\infty} y^n = -1 + 3 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} y^n = 2 + \sum_{n=1}^{\infty} 3(x-1)^n. \end{aligned}$$

Άρα, ο συντελεστής της σειράς είναι ο $a_n = \begin{cases} 3, & n > 0, \\ 2, & n = 0. \end{cases}$

Άσκηση (βλ. λυμένη άσκηση 66)

Να ευρεθεί η σειρά Taylor των συναρτήσεων

i) $f(x) = \cos x$, γύρω από το σημείο $x_0 = \pi$.

ii) $g(x) = \ln(4 - x)$, γύρω από το σημείο $x_0 = 2$.

iii) $h(x) = \frac{x - 1}{(3x - 5)^2}$, γύρω από το σημείο $x_0 = 1$.

Λύση

i) Θέτοντας $y = x - \pi$, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x = \cos(y + \pi) = \cos y \cos \pi - \sin y \sin \pi = -\cos y \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} y^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} (x - \pi)^{2n} \end{aligned}$$

Λύση (συνέχεια)

ii) Θέτοντας $y = x - 2$, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln(4 - x) = \ln(4 - (y + 2)) = \ln(2 - y) = \ln(2(1 - y/2)) \\ &= \ln 2 + \ln(1 - y/2) = \ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (-y/2)^n = \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} y^n \\ &= \ln 2 - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} (x - 2)^n \end{aligned}$$

όταν $-y/2 \in (-1, 1)$, ή ισοδύναμα $x \in (0, 4)$.

Λύση (συνέχεια)

iii) Θέτοντας $y = x - 1$, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned}
 h(x) &= \frac{x-1}{(3x-5)^2} = \frac{y}{(3(y+1)-5)^2} = \frac{y}{(3y-2)^2} = \frac{y}{4(1-3y/2)^2} \\
 &= \frac{y}{4}(1-3y/2)^{-2} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-2}{n} (-3/2)^n y^{n+1} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2-1}{n} (-1)^n (-3/2)^n y^{n+1} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^n}{2^n} y^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)3^n}{2^{n+2}} (x-1)^{n+1}
 \end{aligned}$$

όταν $-3y/2 \in (-1, 1)$, ή ισοδύναμα $x \in (1/3, 5/3)$.

Άσκηση (βλ. άλυτη άσκηση 88)

Να ευρεθεί με τη βοήθεια ενός πολυωνύμου Taylor μια κατά προσέγγιση τιμή του αριθμού $\cos 1$ με ακρίβεια 10^{-4} .

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \cos x$ και εφαρμόζουμε το Θεώρημα Taylor για $x = 1$ και $x_0 = 0$. Αναπτύσσοντας την $f(x)$ γύρω από το 0, έχουμε ότι

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cos(\xi + (n+1)\pi/2) = p_n(x) + R_n(x)$$

όπου

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \quad R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cos(\xi + (n+1)\pi/2)$$

Λύση (συνέχεια)

Για $x = 1$, έχουμε

$$|R_n(1)| = \frac{|\cos(\xi + (n+1)\pi/2)|}{(n+1)!} \leq \frac{1}{(n+1)!}.$$

Επειδή $\frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{10000} \Leftrightarrow (n+1)! \geq 10^4 \Leftrightarrow n \geq 7$,

προκύπτει ότι, για $n \geq 7$, είναι $|\cos 1 - p_7(1)| = |R_7(1)| \leq 10^{-4}$, δηλαδή η προσέγγιση

$$\cos 1 \approx p_7(1) = \sum_{k=0}^3 \frac{(-1)^k}{(2k)!} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{24} - \frac{1}{720} = \frac{389}{720} = 0.5402\bar{7}$$

έχει την απαιτούμενη ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα Python, είναι

$$\cos(1) \approx 0.5403023058681397174, \quad p_7(1) \approx 0.5402777777777778$$

```
from sympy import Symbol, cos, series
x = Symbol('x')
N, point = 7, 1
f = series(cos(x), x, x0 = 0, n = N)
poly = f.remove0() #remove 0() term
val = poly.subs(x,point) #evaluate at x = point
val2 = cos(point).evalf(22)
print("cos(x) =", f, "(Maclaurin series)")
print("p(x) = ", poly, "(Taylor polynomial of degree %d)"%N)
print("p(%d) = %0.22f"%(point, val), "(Approximation of cos
      (%d))"%point)
print("cos(%d) ="%1, val2, "(Higher order approximation)")
print("Error =", val2-val)
```

Output:

```
cos(x) = 1-x**2/2+x**4/24-x**6/720+0(x**7) (Maclaurin series)
p(x) = -x**6/720 + x**4/24 - x**2/2 + 1 (Taylor polynomial
      of degree 7)
p(1) = 0.5402777777777777457047 (Approximation of cos(1))
cos(1) = 0.5403023058681397174009 (Higher order
      approximation)
Error = 0.00002452809036193962314881
```