

# ΣΥΝΟΛΑ - ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ

## ● **Σύνολα**

- ▶ Σχέσεις συνόλων
- ▶ Πράξεις συνόλων
- ▶ Δυναμοσύνολο
- ▶ Καρτεσιανό γινόμενο
- ▶ Διαμερίσεις συνόλων

## ● **Σχέσεις**

- ▶ Σχέσεις ισοδυναμίας
- ▶ Σχέσεις διάταξης
- ▶ Φραγμένα σύνολα

## ● **Απεικονίσεις**

- ▶ Βασικές απεικονίσεις
- ▶ Αμφιμονοσήμαντες απεικονίσεις
- ▶ Γραφική παράσταση
- ▶ Σύνθεση απεικονίσεων
- ▶ Αντίστροφη απεικόνιση
- ▶ Εικόνες συνόλων

# Σύνολα

Το **σύνολο** είναι μια συλλογή αντικειμένων σαφώς καθορισμένων τα οποία θεωρούμε ως μια ολότητα. Τα αντικείμενα που απαρτίζουν ένα σύνολο ονομάζονται **στοιχεία του συνόλου**. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι το αντικείμενο  $x$  ανήκει (αντίστοιχα δεν ανήκει) στο σύνολο  $A$ , τότε σημειώνουμε  $x \in A$  (αντίστοιχα  $x \notin A$ ). Το **κενό σύνολο** είναι το σύνολο που δεν περιέχει κανένα στοιχείο και σημειώνεται με  $\emptyset$  ή  $\varnothing$ .

Τα σύνολα συνήθως συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα, ενώ τα στοιχεία τους με μικρά. Τα σύνολα παρουσιάζονται δια αναγραφής των στοιχείων τους, όπου αυτό είναι δυνατό, αλλιώς δια περιγραφής των στοιχείων του.

**Παραδείγματα.** Τα σύνολα

$$A = \{1, 1/2, -1/3, a\}, B = \{-1, 4, \{-1, 2\}, 6, 1\}$$

δίδονται δια αναγραφής των στοιχείων τους, ενώ τα σύνολα

$$\Gamma = \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 3\} \text{ (ή } \Gamma = \{x \in \mathbb{R} | x^2 > 3\}),$$

$$\Delta = \{x \in \mathbb{N}^* : x \text{ πολλαπλάσιο του } 5\}$$

δια περιγραφής των στοιχείων τους.

## Παρατηρήσεις

1. Σε ένα σύνολο, κάθε στοιχείο μπορεί να εμφανίζεται το πολύ μια φορά.
2. Σε ένα σύνολο, δεν παίζει ρόλο η σειρά που αναγράφονται τα στοιχεία του. Έτσι,  $\{2, -3, 4, 7\} = \{-3, 7, 4, 2\}$ .
3. Το σύνολο  $\{\emptyset\}$  δεν είναι κενό, αλλά περιέχει ακριβώς ένα στοιχείο (είναι μονοσύνολο), το κενό σύνολο. Γενικά, ισχύει  $\{x\} \neq x$ .

Μερικά βασικά σύνολα είναι τα παρακάτω:

$\mathbb{N}$  το σύνολο των **φυσικών αριθμών**,

$\mathbb{Z}$  το σύνολο των **ακεραίων αριθμών**,

$\mathbb{Q}$  το σύνολο των **ρητών αριθμών**,

$\mathbb{R}$  το σύνολο των **πραγματικών αριθμών**,

$\mathbb{C}$  το σύνολο των **μιγαδικών αριθμών**.

Αν  $A$  είναι ένα από τα παραπάνω σύνολα με  $A^*$ , σημειώνουμε το σύνολο που αποτελείται από όλα τα μη μηδενικά στοιχεία του  $A$ .

Κάθε σύνολο της μορφής  $\{1, 2, \dots, n\}$ , όπου  $n \in \mathbb{N}^*$ , ονομάζεται **τμήμα φυσικών αριθμών** και σημειώνεται με  $[n]$ . Για παράδειγμα,  $[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ .

**Εγκλεισμός:** Ένα σύνολο  $A$  είναι **υποσύνολο** ενός συνόλου  $B$  (συμβολισμός  $A \subseteq B$ ) αν και μόνο αν για κάθε  $x \in A$  συνεπάγεται ότι  $x \in B$ . Στην περίπτωση αυτή το  $B$  ονομάζεται **υπερσύνολο** του  $A$ .

Όταν  $A \subseteq B$  και υπάρχει ένα τουλάχιστο στοιχείο του  $B$  που δεν ανήκει στο  $A$  τότε το  $A$  ονομάζεται **γνήσιο υποσύνολο** του  $B$  (συμβολισμός  $A \subset B$ ).

Για παράδειγμα, τα γνήσια υποσύνολα του συνόλου  $A = \{1, 2, 3\}$  είναι τα σύνολα  $\{1, 2\}$ ,  $\{1, 3\}$ ,  $\{2, 3\}$ ,  $\{1\}$ ,  $\{2\}$ ,  $\{3\}$ ,  $\emptyset$ .

Το κενό σύνολο  $\emptyset$  είναι υποσύνολο κάθε συνόλου  $A$ . Κάθε σύνολο  $A$  είναι υποσύνολο του εαυτού του.


**Ισότητα:** Δύο σύνολα ονομάζονται ίσα (συμβολισμός  $A = B$ ) όταν κάθε στοιχείο του ενός συνόλου ανήκει στο άλλο και αντιστρόφως. Προφανώς ισχύει

$$A = B \iff (A \subseteq B \text{ και } B \subseteq A).$$

## Πράξεις συνόλων

(i) Αν  $A, B$  είναι δύο σύνολα τότε η **ένωση** των  $A, B$  (συμβολισμός  $A \cup B$ ) είναι το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία που ανήκουν στο  $A$  ή/και στο  $B$ , δηλαδή

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ή/και } x \in B\}.$$




A	B	$A \cup B$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

(Σημειώνουμε 1 αν το  $x$  ανήκει στο σύνολο και 0 αλλιώς.)

(ii) Αν  $A, B$  είναι δύο σύνολα τότε η **τομή** (συμβολισμός  $A \cap B$ ) των  $A, B$  είναι το σύνολο που αποτελείται από τα κοινά στοιχεία των  $A, B$ , δηλαδή

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ και } x \in B\}$$



A	B	$A \cap B$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Αν για τα  $A, B$  ισχύει ότι  $A \cap B = \emptyset$ , τότε τα  $A, B$  ονομάζονται **ξένα**.

Η ένωση και η τομή των συνόλων ορίζεται για περισσότερα από δύο σύνολα,

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i = \{x : \text{Υπάρχει } i \in [n] \text{ με } x \in A_i\},$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i = \{x : x \in A_i \text{ για κάθε } i \in [n]\}$$

Επίσης σημειώνουμε

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{x : \text{Υπάρχει } i \in \mathbb{N}^* \text{ με } x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{x : x \in A_i \text{ για κάθε } i \in \mathbb{N}^*\}.$$



Γενικότερα, αν  $(A_i)_{i \in I}$  είναι μια οικογένεια συνόλων ορίζεται η ένωση και η τομή τους ως εξής:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \text{Υπάρχει } i \in I \text{ με } x \in A_i\},$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{x : x \in A_i \text{ για κάθε } i \in I\}.$$

### Παραδείγματα


1. Αν  $I = \{3, 7, 11\}$ , τότε  $\bigcup_{i \in I} A_i = A_3 \cup A_7 \cup A_{11}$

2. Αν  $I = \mathbb{N}^*$ , τότε  $\bigcup_{i \in I} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \dots$ .

3. Αν  $I = \{2n : n \in \mathbb{N}^*\}$ , τότε  $\bigcup_{i \in I} A_i = A_2 \cup A_4 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_{2i}$ .

(iii) Έστω ένα σύνολο  $E$  (το οποίο πολλές φορές θα θεωρείται βασικό σύνολο) και  $A \subseteq E$ . Το **συμπλήρωμα** του συνόλου  $A$  (συμβολισμός  $\bar{A}$ ) είναι το σύνολο όλων των στοιχείων του  $E$  που δεν ανήκουν στο  $A$ .

$$\bar{A} = \{x \in E : x \notin A\}$$




$A$	$\bar{A}$
1	0
0	1

Άλλοι συμβολισμοί για το συμπλήρωμα είναι:  $A^c$ ,  $A'$ .

(iv) Αν  $A, B$  είναι δύο σύνολα τότε η **διαφορά** (συμβολισμός  $A \setminus B$ ) είναι το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του  $A$  που δεν ανήκουν στο  $B$ , δηλαδή


$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ και } x \notin B\} = A \cap \bar{B}.$$



A	B	$A \setminus B$
1	1	0
1	0	1
0	1	0
0	0	0

(v) Αν  $A, B$  είναι δύο σύνολα τότε η **συμμετρική διαφορά** των  $A$  και  $B$  (συμβολισμός  $A\Delta B$ ) είναι το σύνολο όλων των στοιχείων του  $A$  που δεν ανήκουν στο  $B$  και όλων των στοιχείων του  $B$  που δεν ανήκουν στο  $A$ , δηλαδή

$$A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$



$A$	$B$	$A\Delta B$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

**Παραδείγματα.** Έστω  $E = [10] = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ ,

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ και } B = \{2, 3, 5, 7, 9\}.$$

Τότε  $A, B \subseteq E$  και

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}, A \cap B = \{2, 3, 5\},$$

$$\bar{A} = \{7, 8, 9, 10\}, \bar{B} = \{1, 4, 6, 8, 10\},$$

$$A \setminus B = \{1, 4, 6\}, B \setminus A = \{7, 9\}, A \Delta B = \{1, 4, 6, 7, 9\}.$$

## Ιδιότητες Πράξεων

- 1  $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- 2  $A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap \Gamma, A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup \Gamma$
- 3  $A \cap (B \cup \Gamma) = (A \cap B) \cup (A \cap \Gamma), A \cup (B \cap \Gamma) = (A \cup B) \cap (A \cup \Gamma)$
- 4  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$  (De Morgan).

Οι αποδείξεις των ιδιοτήτων να γίνουν ως ασκήσεις. Στις επόμενες ασκήσεις δίδονται δυο αντιπροσωπευτικές μέθοδοι απόδειξης.

## Άσκηση 1

Να αποδειχθεί ότι  $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ .

**Λύση.**

$$\begin{aligned}x \in \overline{A \cup B} &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\&\Leftrightarrow x \notin A \text{ και } x \notin B \\&\Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ και } x \in \bar{B} \\&\Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}\end{aligned}$$

οπότε, επειδή χρησιμοποιήθηκαν παντού ισοδυναμίες,

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}.$$

## Άσκηση 2

Να αποδειχθεί ότι  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

**Λύση.** Τα  $A, B, C$  είναι υποσύνολα του  $E$ .

Πού μπορεί να ανήκει κάποιο στοιχείο  $x \in E$ ;

Σημειώνουμε 1 αν το  $x$  ανήκει στο σύνολο και 0 αλλιώς.

$A$	$B$	$C$	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Οι στήλες  $A \cap (B \cup C)$  και  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$  είναι ίδιες. Άρα, τα σύνολα αυτά έχουν τα ίδια στοιχεία του  $E$ , δηλαδή είναι ίσα.



Αν σε ένα τύπο εμφανίζονται:

2 διαφορετικά σύνολα, ο πίνακας έχει  $2^2 = 4$  γραμμές (περιπτώσεις),

3 διαφορετικά σύνολα, ο πίνακας έχει  $2^3 = 8$  γραμμές (περιπτώσεις),

$n$  διαφορετικά σύνολα, ο πίνακας έχει  $2^n$  γραμμές (περιπτώσεις).

Η μέθοδος των πινάκων είναι πρακτική όταν σε ένα τύπο εμφανίζονται το πολύ 4 διαφορετικά σύνολα.

# Δυναμοσύνολο

Το σύνολο όλων των υποσυνόλων ενός συνόλου  $E$  ονομάζεται **δυναμοσύνολο** του  $E$  και συμβολίζεται με  $\mathcal{P}(E)$ .

**Παράδειγμα** Αν  $E = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ , τότε

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{\alpha\}, \{\beta\}, \{\gamma\}, \{\alpha, \beta\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\beta, \gamma\}, E\}.$$

Αν  $F = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ , τότε

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(F) &= \{\emptyset, \{\alpha\}, \{\beta\}, \{\gamma\}, \{\delta\}, \{\alpha, \beta\}, \{\alpha, \gamma\}, \{\alpha, \delta\}, \{\beta, \gamma\}, \{\gamma, \delta\}, \\ &\quad \{\alpha, \beta, \delta\}, \{\alpha, \gamma, \delta\}, \{\beta, \gamma, \delta\}, F\} \\ &= \mathcal{P}(E) \cup \{\emptyset \cup \{\delta\}, \{\alpha\} \cup \{\delta\}, \{\beta\} \cup \{\delta\}, \{\gamma\} \cup \{\delta\}, \{\alpha, \beta\} \cup \{\delta\}, \\ &\quad \{\alpha, \gamma\} \cup \{\delta\}, \{\beta, \gamma\}, E \cup \{\delta\}\}\end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι το  $E$  έχει 3 στοιχεία και το  $\mathcal{P}(E)$  έχει  $2^3 = 8$  στοιχεία. Επίσης, το  $F$  έχει 4 στοιχεία και το  $\mathcal{P}(F)$  έχει  $2^4 = 16$  στοιχεία.

Γενικά ισχύει ότι αν το σύνολο  $E$  έχει  $n$  στοιχεία τότε το  $\mathcal{P}(E)$  θα έχει  $2^n$  στοιχεία.

## Καρτεσιανό γινόμενο

Έστω  $A, B$  δυο μή κενά σύνολα, τότε **καρτεσιανό γινόμενο**, με πρώτο παράγοντα το  $A$  και δεύτερο παράγοντα το  $B$ , ονομάζεται το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών  $(\alpha, \beta)$  με  $\alpha \in A, \beta \in B$  (συμβολισμός  $A \times B$ ), δηλαδή

$$A \times B = \{(\alpha, \beta) : \alpha \in A \text{ και } \beta \in B\}.$$

Όταν το ένα (τουλάχιστον) από τα σύνολα  $A, B$  είναι το κενό σύνολο τότε ως καρτεσιανό γινόμενο τους ορίζεται το κενό σύνολο.

### Παραδείγματα

1. Αν  $A = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  και  $B = \{1, 2\}$  τότε είναι

$$A \times B = \{(\alpha, 1), (\alpha, 2), (\beta, 1), (\beta, 2), (\gamma, 1), (\gamma, 2), (\delta, 1), (\delta, 2)\}$$

και

$$B \times A = \{(1, \alpha), (2, \alpha), (1, \beta), (2, \beta), (1, \gamma), (2, \gamma), (1, \delta), (2, \delta)\}.$$

2. Αν  $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A\}$  και  $B = \{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$  τότε το καρτεσιανό γινόμενο  $A \times B$  είναι το σύνολο των ενδείξεων των 52 καρτιών της τράπουλας.

Η έννοια του καρτεσιανού γινομένου γενικεύεται για περισσότερους από δύο παράγοντες ως εξής:

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i \text{ για κάθε } i \in [n]\}.$$


Εξάλλου, αν  $A_1 = A_2 = \cdots = A_n = A$  τότε το καρτεσιανό γινόμενο  $\underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ φορές}}$  σημειώνεται με  $A^n$ .

Ο συμβολισμός αυτός χρησιμοποιείται συχνά τόσο στη Μαθηματική Ανάλυση όσο και στη Γραμμική Άλγεβρα για τους χώρους  $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots, \mathbb{R}^n$  των δύο, τριών,  $\dots, n$  διαστάσεων.

## Διαμερίσεις

Μια οικογένεια  $(A_i)_{i \in I}$ , μη κενών υποσυνόλων ενός συνόλου  $E$  ονομάζεται **διαμέριση** του  $E$  αν ισχύουν οι παρακάτω δύο συνθήκες:

- (i) τα σύνολα  $A_i$  είναι ανά δύο ξένα,
- (ii) η ένωσή τους είναι το  $E$ .



## Παραδείγματα

- (i) Έστω  $E$  το σύνολο όλων των περιπτώσεων φυσικών αριθμών και  $A_i$ ,  $i \in I = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ , είναι το σύνολο όλων των φυσικών αριθμών που λήγουν σε  $i$ , τότε η οικογένεια  $(A_i)_{i \in I}$  αποτελεί μια διαμέριση του  $E$ .
- (ii) Έστω  $E = \mathbb{R}$  και  $A_i = [i, i + 1)$ , όπου  $i \in \mathbb{Z}$ , τότε η οικογένεια  $(A_i)_{i \in \mathbb{Z}}$  αποτελεί μια διαμέριση του  $\mathbb{R}$ .
- (iii) Έστω  $E$  το σύνολο των ατόμων που φοιτούν στο Πα.Πει.,  $F$  το σύνολο των γυναικών που φοιτούν του Πα.Πει και  $M$  το σύνολο των ανδρών που φοιτούν στο Πα.Πει. Τα σύνολα  $F, M$  αποτελούν μια διαμέριση του  $E$ .  
Μια άλλη διαμέριση του  $E$  ορίζεται από τα σύνολα  $A$  (αντ.  $\bar{A}$ ) των ατόμων που φοιτούν στο Πα.Πει και γεννήθηκαν (αντ. δεν γεννήθηκαν) στην πόλη της Αθήνας.

Έστω  $A, B$  δύο μη κενά σύνολα, τότε κάθε μη κενό υποσύνολο  $R$  του  $A \times B$  ορίζει μια **διμελή σχέση** (ή απλά **σχέση**) μεταξύ των στοιχείων των  $A$  και  $B$ . Συγκεκριμένα, αν για τα στοιχεία  $\alpha \in A$  και  $\beta \in B$  ισχύει  $(\alpha, \beta) \in R$  τότε τα στοιχεία  $\alpha, \beta$  σχετίζονται μέσω της σχέσης  $R$  και σημειώνουμε ότι  $\alpha R \beta$ , δηλαδή

$$\alpha R \beta \iff (\alpha, \beta) \in R.$$

## Παραδείγματα

- (i) Αν  $A$  είναι το σύνολο των καταναλωτικών αγαθών και  $B$  το σύνολο των καταστημάτων, τότε ο προτασιακός τύπος "το αγαθό  $\alpha \in A$  πωλείται στο κατάστημα  $\beta \in B$ " ορίζει μια σχέση μεταξύ των στοιχείων των  $A$  και  $B$ .
- (ii) Αν  $E$  είναι το σύνολο των σπουδαστών ενός έτους, τότε ο προτασιακός τύπος "ο σπουδαστής  $\alpha$  έχει την ίδια επίδοση με το σπουδαστή  $\beta$ " ορίζει μια σχέση των στοιχείων του  $E$ .
- (iii) Αν  $E$  είναι το σύνολο των ευθειών του επιπέδου, τότε η καθετότητα ορίζει μια σχέση (την οποία συμβολίζουμε με  $\perp$ ) μεταξύ των στοιχείων του  $E$ , με  $\epsilon_1 \perp \epsilon_2$  όταν η ευθεία  $\epsilon_1$  είναι κάθετη στην ευθεία  $\epsilon_2$ .
- (iv) Αν  $E$  είναι το σύνολο όλων των φοιτητών του Τμήματος, τότε ορίζεται μια σχέση  $R$  των στοιχείων του  $E$  ως εξής:

$$aRb \Leftrightarrow \text{οι } a, b \text{ είναι φίλοι.}$$

- (v) Αν  $E$  είναι το σύνολο των ανθρώπων, τότε ορίζεται μια σχέση  $R$  των στοιχείων του  $E$  ως εξής:  $aRb$  αν οι  $a, b$  είναι συγγενείς.



Μια σχέση  $R$  στο σύνολο  $E$  (δηλαδή υποσύνολο  $E \times E$ ) ονομάζεται **ανακλαστική** αν για κάθε  $a \in E$  ισχύει ότι  $aRa$ .

**Παραδείγματα**  $E =$  Το σύνολο όλων των ανθρώπων,  $a, b \in E$ .

$aRb \Leftrightarrow$  Οι  $a, b$  έχουν γεννηθεί την ίδια χρονιά. (Είναι ανακλαστική.)

$aSb \Leftrightarrow$  Ο  $a$  είναι πατέρας του  $b$ . (Δεν είναι ανακλαστική.)

Μια σχέση  $R$  στο σύνολο  $E$  ονομάζεται **συμμετρική** αν για κάθε  $a, b \in E$  ισχύει ότι  $aRb \Leftrightarrow bRa$ .

**Παραδείγματα**  $E =$  Το σύνολο όλων των ανθρώπων,  $a, b \in E$ .

$aRb \Leftrightarrow$  Οι  $a, b$  είναι φίλοι. (Είναι συμμετρική.)

$aSb \Leftrightarrow$  Ο  $a$  είναι πατέρας του  $b$ . (Δεν είναι συμμετρική.)

$R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (2, 3), (4, 2), \dots\}$

Αν η  $R$  είναι συμμετρική, τότε θα περιέχει σίγουρα και τα ζεύγη  $(1, 2), (2, 4)$ .

(Μπορεί να περιέχει και άλλα ζεύγη.)

Μια σχέση  $R$  στο σύνολο  $E$  ονομάζεται **μεταβατική** αν και μόνο για κάθε  $a, b, c \in E$  με  $aRb$  και  $bRc$  έπεται ότι  $aRc$ .

**Παραδείγματα**  $E =$  Το σύνολο όλων των ανθρώπων,  $a, b, c \in E$ .

$aRb \Leftrightarrow$  Οι  $a, b$  είναι αδερφια (με τους ίδιους γονείς). (Είναι μεταβατική.)

$aSb \Leftrightarrow$  Οι  $a, b$  είναι γνωστοί/φίλοι. (Δεν είναι μεταβατική.)

## Σχέσεις Ισοδυναμίας

Μια σχέση  $R$  στο  $E$  ονομάζεται **ισοδυναμία** όταν ικανοποιεί τις ιδιότητες :

(i)  $\alpha R \alpha$ , για κάθε  $\alpha \in E$  (**ανακλαστική**)

(ii)  $\alpha R \beta \Leftrightarrow \beta R \alpha$ , για κάθε  $\alpha, \beta \in E$  (**συμμετρική**)

(iii)  $\alpha R \beta$  και  $\beta R \gamma \implies \alpha R \gamma$ , για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in E$  (**μεταβατική**).

Συνήθως η σχέση ισοδυναμίας σημειώνεται με  $\sim$  αντί  $R$ .

### Παραδείγματα

1. Αν  $E$  είναι το σύνολο των φοιτητών που φοιτούν στο Πα.Πει., τότε η σχέση  $R$  με

$$aRb \Leftrightarrow a, b \text{ φοιτούν στο ίδιο Τμήμα του Πα.Πει.}$$

είναι μια σχέση ισοδυναμίας.

2. Αν  $E = \mathbb{N}^*$  τότε το σύνολο  $R = \{(x, y) : |x - y| \text{ πολλαπλάσιο του } 2\}$  ορίζει μια σχέση ισοδυναμίας, με  $n_1 \sim n_2$  όταν  $\frac{n_1 - n_2}{2}$  είναι ακέραιος αριθμός.

Αν  $\sim$  είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο  $E$  και  $\alpha \in E$  τότε το σύνολο

$$C_\alpha = \{\beta \in E : \beta \sim \alpha\}$$

ονομάζεται **κλάση ισοδυναμίας** του στοιχείου  $\alpha$ .

Για παράδειγμα, η κλάση ισοδυναμίας  $C_\alpha$  ενός φοιτητή  $\alpha$  του Πα.Πει. σύμφωνα με την σχέση  $R$  του 1ου παραδείγματος, είναι το σύνολο όλων των φοιτητών που φοιτούν στο ίδιο Τμήμα με αυτόν.

Οι κλάσεις ισοδυναμίας μπορεί να συμπίπτουν για ορισμένα  $\alpha \in E$ .

Συγκεκριμένα ισχύουν οι παρακάτω ιδιότητες:

1.  $\alpha \in C_\alpha$ , για κάθε  $\alpha \in E$ .
2.  $\alpha \sim \beta \implies C_\alpha = C_\beta$ .
3.  $\alpha \not\sim \beta \implies C_\alpha \cap C_\beta = \emptyset$ .

Από τις τρεις ιδιότητες αυτές προκύπτει ότι:

**Κάθε σχέση ισοδυναμίας στο  $E$  ορίζει μια διαμέριση του  $E$ .**

Ισχύει και το **αντίστροφο**, δηλαδή αν  $(A_i)$  είναι μια διαμέριση του  $E$ , τότε ορίζουμε τη σχέση  $R$  στο  $E$  ως εξής:

$$xRy \Leftrightarrow \text{Υπάρχει } i \in I \text{ με } x, y \in A_i.$$

Εύκολα προκύπτει ότι η σχέση αυτή ικανοποιεί τις ιδιότητες (i),(ii) και (iii) οπότε είναι μια σχέση ισοδυναμίας με κλάσεις ισοδυναμίας τα σύνολα  $A_i$ .

Το σύνολο  $\{C_\alpha : \alpha \in E\}$  ονομάζεται **σύνολο πηλίκο** του  $E$  για τη σχέση  $\sim$  και συμβολίζεται με  $E/\sim$ .

Για παράδειγμα, το σύνολο πηλίκο της σχέσης  $R$  του πρώτου παραδείγματος είναι το σύνολο των 10 Τμημάτων του Πα.Πει.

Το σύνολο πηλίκο της σχέσης του 2ου παραδείγματος είναι το σύνολο  $\{A_1, A_2\}$  όπου  $A_1, A_2$  είναι αντίστοιχα τα σύνολα των περιπτών και άρτιων αριθμών.

Μια σχέση  $R$  στο σύνολο  $E$  ονομάζεται **αντισυμμετρική** ανν για κάθε  $a, b \in E$  το πολύ ένα από  $(a, b)$  και  $(b, a)$  ανήκει στην σχέση  $R$ .

**Παράδειγμα** Αν η  $R$  είναι αντισυμμετρική τότε

$$(1, 2) \in R \Rightarrow (2, 1) \notin R.$$

Ισοδύναμα μια σχέση  $R$  είναι αντισυμμετρική αν έχει την ιδιότητα ότι αν  $aRb$  και  $bRa$  τότε  $a = b$ .

## Σχέσεις διάταξης

Μια σχέση  $R$  στο  $E$  ονομάζεται (μερική) **διάταξη** όταν ικανοποιεί τις ιδιότητες :

(i)  $\alpha R \alpha$ , για κάθε  $\alpha \in E$  (**ανακλαστική**)

(ii)  $\alpha R \beta$  και  $\beta R \alpha \implies \alpha = \beta$ , για κάθε  $\alpha, \beta \in E$  (**αντισυμμετρική**)

(iii)  $\alpha R \beta$  και  $\beta R \gamma \implies \alpha R \gamma$ , για κάθε  $\alpha, \beta, \gamma \in E$  (**μεταβατική**).

Συνήθως η σχέση διάταξης σημειώνεται με  $\leq$ .

Η διάταξη ονομάζεται **ολική** αν ικανοποιεί την ιδιότητα

$$\alpha \leq \beta \text{ ή } \beta \leq \alpha, \quad \forall \alpha, \beta \in E.$$

## Παραδείγματα

1. Η σχέση  $\leq$  στο  $\mathbb{R}$  είναι ολική διάταξη, ενώ η σχέση  $<$  στο  $\mathbb{R}$  δεν είναι διάταξη.
2. Η σχέση διαιρετότητας  $|$  στο  $\mathbb{N}^*$  είναι μερική διάταξη.



### Άσκηση 3 (Μερική διάταξη διαιρετότητας)

Στο σύνολο  $\mathbb{N}^*$ , ορίζουμε την σχέση διαιρετότητας  $|$  ως εξής

$$\begin{aligned}x | y &\Leftrightarrow x \text{ διαιρεί τον } y \\ &\Leftrightarrow \text{υπάρχει } k \in \mathbb{N}^* \text{ ώστε } y = kx.\end{aligned}$$

- 1 Να δειχθεί ότι η σχέση διαιρετότητας  $|$  είναι σχέση μερικής διάταξης στο  $\mathbb{N}^*$ .
- 2 Είναι η σχέση διαιρετότητας  $|$  σχέση ολικής διάταξης στο  $\mathbb{N}^*$ ;

## Λύση του (1).

(Ανακλαστική ιδιότητα.) Για κάθε  $x \in \mathbb{N}^*$  ισχύει ότι  $x = 1 \cdot x$ , άρα  $x \mid x$ .

(Αντισυμμετρική ιδιότητα.) Θεωρούμε  $x, y \in \mathbb{N}^*$  με  $x \mid y$  και  $y \mid x$ . Τότε, υπάρχουν  $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$  ώστε  $y = k_1x$  και  $x = k_2y$ , οπότε  $y = k_1k_2y$  και

$$y = k_1k_2y \Rightarrow k_1k_2 = 1 \Rightarrow k_1 = k_2 = 1 \Rightarrow x = y.$$

(Μεταβατική ιδιότητα.) Θεωρούμε  $x, y, z \in \mathbb{N}^*$  με  $x \mid y$  και  $y \mid z$ . Τότε, υπάρχουν  $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$  ώστε  $y = k_1x$  και  $z = k_2y$ , οπότε  $z = k_2k_1x$ . Επειδή  $k_2k_1 \in \mathbb{N}^*$  έπεται ότι  $x \mid z$ .

Κατόπιν τούτων, η σχέση  $\mid$  είναι σχέση μερικής διάταξης στο  $\mathbb{N}^*$ .

Λύση του (ii). Δεν είναι ολική διάταξη στο  $\mathbb{N}^*$ , διότι υπάρχουν αριθμοί στο  $\mathbb{N}^*$  που δεν συγκρίνονται. Για παράδειγμα,

$$3 \nmid 5 \text{ και } 5 \nmid 3.$$



3. Η σχέση εγκλεισμού  $\subseteq$  στο  $\mathcal{P}(E)$  είναι μερική διάταξη.

Πράγματι, ισχύουν οι ιδιότητες

(i)  $A \subseteq A$  για κάθε  $A \subseteq E$ .

(ii) Αν  $A \subseteq B$  και  $B \subseteq A$ , τότε  $A = B$  για κάθε  $A, B \subseteq E$ .

(iii) Αν  $A \subseteq B$  και  $B \subseteq C$ , τότε  $A \subseteq C$  για κάθε  $A, B, C \subseteq E$ .

Η σχέση αυτή δεν είναι ολική, αφού για παράδειγμα τα σύνολα  $\{x\}$  και  $\{y\}$  δεν συγκρίνονται όταν  $x \neq y$ .

Ένα σύνολο  $E$  εφοδιασμένο με μια μερική (αντίστοιχα ολική) διάταξη ονομάζεται **μερικά** (αντίστοιχα **ολικά**) διατεταγμένο σύνολο και σημειώνεται με  $(E, \leq)$ .

## Φραγμένα σύνολα

Αν  $(E, \leq)$  είναι ένα διατεταγμένο σύνολο και  $A$  είναι ένα μη κενό υποσύνολό του τότε ένα στοιχείο  $\alpha \in E$  (αντίστοιχα  $\beta \in E$ ) ονομάζεται **άνω** (αντίστοιχα **κάτω**) φράγμα του  $A$  όταν  $x \leq \alpha$  (αντίστοιχα  $\beta \leq x$ ) για κάθε  $x \in A$ . Όταν υπάρχει ένα τουλάχιστον άνω (αντίστοιχα κάτω) φράγμα ενός συνόλου  $A$ , τότε το σύνολο αυτό ονομάζεται **άνω** (αντίστοιχα **κάτω**) **φραγμένο** σύνολο.

Αν  $A$  είναι ένα άνω (αντίστοιχα κάτω) φραγμένο υποσύνολο του  $(E, \leq)$  τότε ένα στοιχείο  $s \in E$  (αντίστοιχα  $i \in E$ ) που ικανοποιεί τις ιδιότητες:

- (i)  $s$  είναι άνω φράγμα (αντίστοιχα  $i$  είναι κάτω φράγμα).
- (ii)  $s \leq \alpha$  (αντίστοιχα  $\beta \leq i$ ) για κάθε άνω φράγμα  $\alpha$  (αντίστοιχα κάτω φράγμα  $\beta$ ) του  $A$  ονομάζεται **supremum ή άνω πέρασ** (αντίστοιχα **infimum ή κάτω πέρασ**) του  $A$  και σημειώνεται με  $\sup A$  (αντίστοιχα  $\inf A$ ).

Πρέπει να τονισθεί ότι τα  $\sup A$  και  $\inf A$  δεν υπάρχουν πάντα για ένα σύνολο. Όταν όμως υπάρχουν είναι μοναδικά. Γενικά το  $\sup A$  (αντίστοιχα  $\inf A$ ) δεν ανήκει υποχρεωτικά στο σύνολο  $A$ . Όμως, στην περίπτωση που ανήκει ονομάζεται **μέγιστο** (αντίστοιχα **ελάχιστο**) στοιχείο του  $A$  και σημειώνεται με  $\max A$  (αντίστοιχα  $\min A$ ).

## Παραδείγματα

1. Για το ολικά διατεταγμένο σύνολο  $(\mathbb{R}, \leq)$  είναι:

α) Αν  $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^*\}$  τότε  $\sup A = 1$  και  $\inf A = 0$ .

Το 1 είναι μέγιστο στοιχείο του  $A$ , διότι  $1 \in A$ , ενώ το  $A$  δεν έχει ελάχιστο, αφού  $0 \notin A$ .

β) Αν  $A = (\alpha, \beta)$  τότε  $\sup A = \beta$  και  $\inf A = \alpha$ .

Το  $A$  δεν έχει μέγιστο, ούτε ελάχιστο στοιχείο, αφού τα  $\alpha, \beta$  δεν ανήκουν στο  $A$ .

2. Για το μερικά διατεταγμένο σύνολο  $(\mathbb{N}^*, |)$ , όπου  $|$  είναι η σχέση διαιρετότητας και  $A = \{4, 16, 28, 40\}$  ισχύει ότι

$n \in \mathbb{N}^*$  είναι άνω φράγμα του  $A$

$$\Leftrightarrow 4|n \text{ και } 16|n \text{ και } 28|n \text{ και } 40|n$$

$\Leftrightarrow n$  κοινό πολλαπλάσιο των στοιχείων του  $A$

Οπότε, το ελάχιστο άνω φράγμα του  $A$  θα είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των στοιχείων του  $A$ , δηλαδή

$$\sup A = \text{ΕΚΠ}(4, 16, 28, 40) = 560.$$

Ομοίως, προκύπτει ότι

$$\inf A = \text{ΜΚΔ}(4, 16, 28, 40) = 4.$$

3. Για το μερικά διατεταγμένο σύνολο  $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$  όπου  $E = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$  και

$$A = \{\{2, 4, 8\}, \{6, 8\}, \{2, 8, 10\}, \{4, 8\}\}$$

ισχύουν ότι

$B$  είναι άνω φράγμα του  $A$

$$\Leftrightarrow \{2, 4, 8\} \subseteq B, \{6, 8\} \subseteq B, \{2, 8, 10\} \subseteq B, \{4, 8\} \subseteq B$$

Οπότε, το ελάχιστο άνω φράγμα του  $A$  θα είναι το "μικρότερο" τέτοιο σύνολο  $B$ , δηλαδή η ένωση όλων των στοιχείων του  $A$ . Κατόπιν τούτου, είναι

$$\sup A = \{2, 4, 8\} \cup \{6, 8\} \cup \{2, 8, 10\} \cup \{4, 8\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}.$$

Ομοίως, προκύπτει ότι

$$\inf A = \{2, 4, 8\} \cap \{6, 8\} \cap \{2, 8, 10\} \cap \{4, 8\} = \{8\}.$$

## Ασκήσεις προς επίλυση

- 1 Έστω  $E$  ένα μη κενό σύνολο και  $A, B, C \subseteq E$ . Ναδειχθεί ότι

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

(Επιμεριστική ιδιότητα της τομής ως προς την διαφορά.)

- 2 Στο σύνολο  $\mathbb{N}$  ορίζουμε μια σχέση  $R$  ως εξής:

$$xRy \Leftrightarrow \text{Υπάρχει } k \in \mathbb{Z} \text{ ώστε } y - x = 3k.$$

Για παράδειγμα,

$$2R5, \text{ διότι } 5 - 2 = 3 \cdot 1$$

$$2R8, \text{ διότι } 8 - 2 = 3 \cdot 2$$

$$8R2, \text{ διότι } 2 - 8 = 3 \cdot (-2)$$

$$(3, 7) \notin R \text{ διότι δεν υπάρχει } k \in \mathbb{Z} \text{ ώστε } 7 - 3 = 4 = 3k.$$

Ναδειχθεί ότι η σχέση  $R$  είναι σχέση ισοδυναμίας στο  $\mathbb{N}$ .

- 3 Έστω  $R$  σχέση στο  $\mathbb{N}$ , με  $xRy \Leftrightarrow x = y^k$ , για κάποιο  $k \in \mathbb{N}^*$ . Ναδειχθεί ότι η  $R$  είναι σχέση μερικής διάταξης. Είναι η  $R$  σχέση ολικής διάταξης;



## Ασκήσεις προς επίλυση

- 4 Έστω το διατεταγμένο σύνολο  $(\mathbb{N}^*, |)$  και

$$A_1 = \{32, 80, 160, 640\}$$

$$A_2 = \{n \in \mathbb{N}^* : n \text{ περιπτός, } n^2 \leq 40\}$$

Να ευρεθούν τα supremum και infimum των παραπάνω συνόλων. Ποια από αυτά έχουν μέγιστο ή ελάχιστο;

- 5 Έστω το διατεταγμένο σύνολο  $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$  όπου  $E = \{5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40\}$


$$A_1 = \{\{10, 15\}, \{5, 20, 25\}, \{10, 30\}, \{20, 35\}\}$$

$$A_2 = \{\{10, 20, 25\}, \{5, 10, 40\}, \{5, 10, 35\}, \{5, 10, 20, 40\}\}$$

Να ευρεθούν τα supremum και infimum των παραπάνω συνόλων. Ποια από αυτά έχουν μέγιστο ή ελάχιστο;

# Απεικονίσεις

Δίνονται δύο μη κενά σύνολα  $A, B$  και ένας κανόνας (που συνήθως μπορεί να περιγραφεί από ένα τύπο) με τον οποίο αντιστοιχίζουμε σε κάθε στοιχείο του  $A$  ένα και μόνο ένα στοιχείο του  $B$ . Τότε ορίζεται μια απεικόνιση  $f$  του  $A$  στο  $B$  (συμβολισμός  $f : A \rightarrow B$ ).



Το σύνολο  $A$  ονομάζεται **πεδίο ορισμού** της  $f$  και συμβολίζεται με  $D(f)$  ή  $D_f$  τα δε στοιχεία του ονομάζονται **πρότυπα**. Αν το πρότυπο  $\alpha$  αντιστοιχίζεται μέσω της  $f$  στο στοιχείο  $\beta$  τότε σημειώνουμε  $f(\alpha) = \beta$ . Στην περίπτωση αυτή το  $\beta$  ονομάζεται **εικόνα** του στοιχείου  $\alpha$ .

Το υποσύνολο του  $B$  που αποτελείται από όλες τις εικόνες ονομάζεται **σύνολο τιμών** της  $f$  και συμβολίζεται με  $R(f)$  ή  $R_f$ , δηλαδή

$$R(f) = \{\beta \in B : \text{υπάρχει } \alpha \in A \text{ με } f(\alpha) = \beta\} = \{f(x) : x \in D(f)\}$$

Μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  με  $A \subseteq \mathbb{R}$  ονομάζεται **πραγματική συνάρτηση μιας μεταβλητής** (ή απλά **συνάρτηση**). Στην περίπτωση αυτή το τυχαίο στοιχείο του  $A$  συμβολίζεται συνήθως με  $x$  και ονομάζεται **ανεξάρτητη μεταβλητή** ενώ η εικόνα του  $y = f(x)$  ονομάζεται **τιμή** της ανεξάρτητης μεταβλητής. Το τυχαίο στοιχείο  $y \in R(f)$  ονομάζεται **εξαρτημένη μεταβλητή**.

Γενικότερα, αν  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  η απεικόνιση  $f : A \rightarrow R$  ονομάζεται πραγματική συνάρτηση  $n$  μεταβλητών. Εδώ έχουμε  $n$  το πλήθος ανεξάρτητες μεταβλητές και μια εξαρτημένη  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Όταν μια πραγματική συνάρτηση  $f$ ,  $n$  μεταβλητών, δε συνοδεύεται από το πεδίο ορισμού της, τότε ως  $D(f)$  νοείται το ευρύτερο υποσύνολο του  $\mathbb{R}^n$ , με την ιδιότητα ότι για κάθε  $x \in D(f)$  μπορεί να ορισθεί ο αριθμός  $f(x) \in \mathbb{R}$ .

Η απεικόνιση  $f : A \rightarrow A$  με  $f(x) = x$  για κάθε  $x \in A$  ονομάζεται **ταυτοτική απεικόνιση** του  $A$  και σημειώνεται με  $1_A$ .

Μια απεικόνιση  $f$  ονομάζεται **σταθερή** αν το σύνολο τιμών της είναι μονοσύνολο, δηλαδή  $R(f) = \{\beta\}$ .

Αν  $A$  είναι ένα μη κενό υποσύνολο ενός συνόλου  $E$  τότε η απεικόνιση  $f : E \rightarrow \{0, 1\}$  με

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{αν } x \in A \\ 0, & \text{αν } x \notin A \end{cases}$$

ονομάζεται **χαρακτηριστική συνάρτηση του**  $A$  και συμβολίζεται με  $\mu_A$  (ή  $\chi_A$ ). Η χαρακτηριστική συνάρτηση χρησιμεύει για τον καθορισμό των σχέσεων και πράξεων των συνόλων όπως φαίνεται και από την επόμενη άσκηση.

## Παράδειγμα

$E = [10]$  ,  $A = \{1, 3, 7, 8, 9\}$  ,  $B = \{2, 3, 5, 9, 10\}$  ,  $A \cap B = \{3, 9\}$  ,  
 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10\}$ .

Στην περίπτωση αυτή, η χαρακτηριστική συνάρτηση οποιουδήποτε υποσυνόλου  $F$  του  $E$  μπορεί να αναπαρασταθεί από μια 10-άδα (δυναδική λέξη)

$$\mu_F = (\mu_F(1), \mu_F(2), \dots, \mu_F(10))$$

οπότε

$$\mu_A = (1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0)$$

$$\mu_B = (0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1)$$

$$\mu_{A \cap B} = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$$

$$\mu_{A \cup B} = (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1)$$

Παρατηρούμε ότι

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_{A \cap B}(x), \forall x \in E.$$

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x), \forall x \in E.$$

## Αμφιμονοσήμαντες απεικονίσεις

(i) Μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$  ονομάζεται **1 – 1** όταν δύο οποιαδήποτε διαφορετικά πρότυπα έχουν διαφορετικές εικόνες, δηλαδή

$$\text{για κάθε } x_1, x_2 \in A \text{ με } x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2),$$

Ισοδύναμα για κάθε  $x_1, x_2 \in A$  με  $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$ .


(ii) Μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$  ονομάζεται **επί** όταν κάθε στοιχείο του  $B$  είναι εικόνα κάποιου στοιχείου του  $A$ , δηλαδή όταν  $B = R(f)$ .

(iii) Μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$  ονομάζεται **αμφιμονοσήμαντη** όταν είναι **1 – 1** και **επί**.




## Παραδείγματα

α)




Δεν είναι ούτε 1-1 ούτε επί.

β)




Είναι 1-1 αλλά όχι επί.

γ)



Είναι επί αλλά όχι 1-1.

δ)



Είναι αμφιμονοσήμαντη.


Έστω η απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$ , τότε το σύνολο

$$\{(x, y) \in A \times B : y = f(x)\}$$

ονομάζεται **γραφική παράσταση** ή (**διάγραμμα**) της απεικόνισης  $f$  και συμβολίζεται με  $G(f)$  (ή  $G_f$ ).


Η γραφική παράσταση μιας πραγματικής συνάρτησης μιας μεταβλητής συνήθως είναι δυνατό να σχεδιασθεί στο Καρτεσιανό επίπεδο και έχει την ιδιότητα ότι κάθε παράλληλη ευθεία προς τον άξονα  $Oy$  την τέμνει σε ένα το πολύ σημείο.

**Παράδειγμα.** Η καμπύλη του επόμενου σχήματος δεν είναι γραφική παράσταση κάποιας πραγματικής συνάρτησης της μεταβλητής  $x$ , διότι τέμνεται από την ευθεία  $x = 1$  σε 2 σημεία.



Αν η συνάρτηση είναι 1 – 1, τότε και κάθε παράλληλη ευθεία προς τον άξονα  $Ox$  πρέπει να την τέμνει σε ένα το πολύ σημείο.

### Παράδειγμα



Η συνάρτηση  $y = f(x)$  δεν είναι 1 – 1 διότι τέμνεται από την ευθεία  $y = a$  σε τρία σημεία.

Υπάρχουν συναρτήσεις των οποίων δεν είναι δυνατό να σχεδιασθεί η γραφική παράσταση. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνάρτηση του Dirichlet που ορίζεται ως εξής:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{αν } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{αν } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$


## Σύνθεση απεικονίσεων

Δίνονται δύο απεικονίσεις  $f, g$  με  $R(f) \cap D(g) \neq \emptyset$ .

Τότε ορίζεται μια καινούρια απεικόνιση που ονομάζεται **σύνθεση** της  $g$  με την  $f$ , και συμβολίζεται με  $g \circ f$ , ως εξής:

$$D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\},$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$



## Παράδειγμα

Δίνονται οι συναρτήσεις  $f, g$  με τύπους  $f(x) = x^2 + 2$  και  $g(x) = \sqrt{x - 6}$ . Τότε  $D(f) = \mathbb{R}, R(f) = [2, +\infty), D(g) = [6, +\infty)$  και  $R(g) = [0, +\infty)$ .

Είναι  $D(g \circ f) = \{x \in D(f) : f(x) \in D(g)\} = \{x \in \mathbb{R} : x^2 + 2 \geq 6\} = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$

και  $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{f(x) - 6} = \sqrt{x^2 - 4}$ .

Επιπλέον,  $D(f \circ g) = \{x \in D(g) : g(x) \in D(f)\} = \{x \in [6, +\infty) : \sqrt{x - 6} \in \mathbb{R}\} = [6, +\infty)$

και  $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 + 2 = x - 4$ .

Όπως προκύπτει και από το προηγούμενο παράδειγμα οι συναρτήσεις  $g \circ f$  και  $f \circ g$  είναι εν γένει διαφορετικές.

## Άσκηση

Δίνονται οι συναρτήσεις  $f : A \rightarrow B$  και  $g : B \rightarrow \Gamma$ . Ναδειχθεί ότι αν  $f, g$  είναι 1 - 1 (αντίστοιχα επί) τότε και η σύνθεσή τους  $g \circ f$  είναι 1 - 1 (αντίστοιχα επί).



## Αντίστροφη απεικόνιση


Έστω  $f : A \rightarrow B$  μια αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση, τότε η **αντίστροφη απεικόνιση** της  $f$ , που συμβολίζεται με  $f^{-1}$ , είναι η απεικόνιση που σε κάθε  $y \in B$  αντιστοιχεί το μοναδικό  $x \in A$  με  $f(x) = y$ , δηλαδή ισχύει :

$$f^{-1} : B \rightarrow A \text{ με } f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y.$$


Εύκολα προκύπτει ότι  $f^{-1} \circ f = 1_A$  και  $f \circ f^{-1} = 1_B$ .

Προκειμένου να ορίσουμε την αντίστροφη απεικόνιση μιας 1 – 1 αλλά όχι επί απεικόνισης  $f : A \rightarrow B$  θεωρούμε αντί του συνόλου  $B$  το σύνολο  $R(f)$  και ορίζουμε την  $f^{-1} : R(f) \rightarrow A$ .

**Παράδειγμα.** Στο επόμενο σχήμα φαίνεται μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$  και η αντίστροφή της, όπου  $A = \{1, 2, 3\}$  και  $B = \{a, b, c, d, e\}$ .



Η γραφική παράσταση της αντίστροφης μια αμφιμονοσήμαντης συνάρτησης μιας μεταβλητής  $f$  στο Καρτεσιανό επίπεδο είναι συμμετρική της γραφικής παράστασης της  $f$  ως προς την ευθεία  $y = x$ .



**Άσκηση** Αν  $f : A \rightarrow B$  και  $g : B \rightarrow \Gamma$  είναι δυο αμφιμονοσήμαντες απεικονίσεις τότε  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

Αν  $f : A \rightarrow B$  είναι μια απεικόνιση και  $\Gamma \subseteq A$ ,  $\Delta \subseteq B$  τότε τα σύνολα


$$f(\Gamma) = \{y \in B : \text{υπάρχει } x \in \Gamma \text{ με } y = f(x)\} = \{f(x) : x \in \Gamma\}$$

και

$$f^{-1}(\Delta) = \{x \in A : f(x) \in \Delta\}$$

ονομάζονται αντίστοιχα **εικόνα** του  $\Gamma$  και **αντίστροφη εικόνα** του  $\Delta$ .

## Παράδειγμα



$$f(\{2, 3\}) = f(\{2, 3, 4\}) = \{c, d\}$$

$$f^{-1}(\{a, c\}) = f^{-1}(\{a, c, e\}) = \{1, 6, 3, 4\}$$

$$f(f^{-1}(\{a, c, e\})) = f(\{1, 6, 3, 4\}) = \{a, c\} \subset \{a, c, e\}$$

$$f^{-1}(f(\{2, 3\})) = f^{-1}(\{c, d\}) = \{2, 3, 4\} \supset \{2, 3\}.$$

Εύκολα αποδεικνύονται οι παρακάτω ιδιότητες

- 1  $f(\emptyset) = \emptyset, f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$
- 2  $f(f^{-1}(\Delta)) \subseteq \Delta$  και  $f^{-1}(f(\Gamma)) \supseteq \Gamma.$
- 3
  - 1  $f(\Gamma_1) \subseteq f(\Gamma_2),$  όταν  $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2 \subseteq A.$
  - 2  $f^{-1}(\Delta_1) \subseteq f^{-1}(\Delta_2),$  όταν  $\Delta_1 \subseteq \Delta_2 \subseteq B.$
- 4
  - 1  $f(\Gamma_1 \cup \Gamma_2) = f(\Gamma_1) \cup f(\Gamma_2),$  όταν  $\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq A.$
  - 2  $f^{-1}(\Delta_1 \cup \Delta_2) = f^{-1}(\Delta_1) \cup f^{-1}(\Delta_2),$  όταν  $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq B.$
- 5
  - 1  $f(\Gamma_1 \cap \Gamma_2) \subseteq f(\Gamma_1) \cap f(\Gamma_2),$  όταν  $\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq A.$
  - 2  $f^{-1}(\Delta_1 \cap \Delta_2) = f^{-1}(\Delta_1) \cap f^{-1}(\Delta_2),$  όταν  $\Delta_1, \Delta_2 \subseteq B.$

**Πρόταση.** Για μια απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$  ισχύουν

(i)  $f$  1 – 1 αν και μόνον αν  $f^{-1}(f(\Gamma)) = \Gamma, \forall \Gamma \subseteq A$ .

(ii)  $f$  επί αν και μόνον αν  $f(f^{-1}(\Delta)) = \Delta, \forall \Delta \subseteq B$ .

(iii)  $f$  1 – 1 αν και μόνον αν  $f(\Gamma_1 \cap \Gamma_2) = f(\Gamma_1) \cap f(\Gamma_2)$  για κάθε  $\Gamma_1, \Gamma_2 \subseteq A$ .

### Απόδειξη της (i)

Έστω ότι η απεικόνιση  $f$  είναι 1 – 1· θα δειχθεί ότι  $f^{-1}(f(\Gamma)) = \Gamma$ . Σύμφωνα με την ιδιότητα 2, αρκεί να δειχθεί ότι  $f^{-1}(f(\Gamma)) \subseteq \Gamma$ . Πραγματικά, αν  $x \in f^{-1}(f(\Gamma))$  τότε  $f(x) \in f(\Gamma)$  οπότε θα υπάρχει  $\xi \in \Gamma$  με  $f(x) = f(\xi)$ . Επειδή η συνάρτηση  $f$  είναι 1 – 1 έπεται ότι  $x = \xi$  οπότε  $x \in \Gamma$ . Ανίστροφα αν  $f^{-1}(f(\Gamma)) = \Gamma \forall \Gamma \subseteq A$ , θα δειχθεί ότι η  $f$  είναι 1 – 1. Πραγματικά, αν  $x_1, x_2 \in A$  με  $f(x_1) = f(x_2)$  εφαρμόζουμε τη δοσμένη ισότητα για  $\Gamma = \{x_1\}$ , οπότε προκύπτει ότι  $x_2 \in f^{-1}(f(\{x_1\})) = \{x_1\}$  και επομένως  $x_1 = x_2$ .

## Ασκήσεις προς επίλυση

1. Να αποδειχθούν τα παρακάτω
- (i)  $A = B$  αν και μόνο αν  $\mu_A(x) = \mu_B(x), \forall x \in E$ .
  - (ii)  $A \subseteq B$  αν και μόνο αν  $\mu_A(x) \leq \mu_B(x), \forall x \in E$ .
  - (iii)  $\mu_A(x) + \mu_{\bar{A}}(x) = 1$  για κάθε  $x \in E$ .
  - (iv)  $\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_{A \cap B}(x), \forall x \in E$ .
  - (v)  $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \cdot \mu_B(x), \forall x \in E$ .
- (Υπόδειξη: Διακρίνετε περιπτώσεις για το  $x \in E$ )
2. Σε ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις η συνάρτηση  $f : A \rightarrow B$  είναι 1-1, επί, ή αμφιμονοσήμαντη;
- (i)  $A = [0, 1], B = [5, 9]$  και  $f(x) = 3x + 5$ .
  - (ii)  $A = [-2, 2], B = [0, 4]$  και  $f(x) = x^2$ .
  - (iii)  $A = [0, 2], B = [\frac{1}{3}, 1]$  και  $f(x) = \frac{1}{x+1}$ .
3. Δίνονται τα σύνολα  $A = \{2^3, 2^4, 2^5, \dots\}$  και  $B = \{4^6, 4^8, 4^{10}, \dots\}$ . Να δοθεί μια αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση  $f : A \rightarrow B$ .
4. Έστω  $A = \{1, 2, 4, 3, 5, 6, 7\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$  και  $f : A \rightarrow B$  με  $f(x) = (x - 5)(x - 4)$ . Να βρεθούν τα σύνολα  $f(A), f(\{3, 4\}), f(\emptyset), f(\{1, 2, 6\}), f^{-1}(B), f^{-1}(\{2\}), f^{-1}(\{0\}), f^{-1}(\{0, 2\})$ .